

KAMSALAMANDER MET VIJF POTEN

Alex Wieland

Circa vijf jaar geleden is in een weiland bij Hulst een woonwijk aangelegd. In het weiland lagen een drietal voorplantingswateren van kamsalamanders. Deze wateren zijn met het bouwrijp maken van het terrein gedempt. Momenteel zitten er nog steeds kamsalamanders in de drinkputten, grenzend aan de woonwijk. Ook in visvrije tuinvijvers in de woonwijk zijn nog kamsalamanders te vinden.

vijver leeghalen

Op één adres hebben de bewoners een grote vijver gegraven met een wateroppervlakte van circa twintig vierkante meter. In april 2002 besloten de bewoners de vijver te verkleinen. Hiervoor werd de vijver drooggelegd. Al snel kwamen ze er achter dat er salamanders in de vijver zaten. Met schepnet en amfibieënfuiken werden de salamanders gevangen en overgebracht naar een drinkput gelegen op 150 meter van de vijver. In totaal werden er 45 kleine watersalamanders gevangen (variërend in grootte van 4 tot 7 cm), waarvan de meeste nog kieuwen hadden. Het ging dus waarschijnlijk om jongen van vorig jaar, die in de vijver overwinterd hebben. Ook werden negen kamsalamanders gevangen, waarvan vijf jonge dieren (variërend in grootte van 6,5 tot 9 cm).

Eén van deze jonge kamsalamanders was in het bezit van een vijfde pootje. Dit pootje was slechts een halve centimeter groot en bevond zich direct achter de kop, voor de rechtersvoorpot. Het dier kon het pootje onafhankelijk van de andere poten bewegen.

bruistablet

De eigenaar van de tuinvijver heeft om algenoverlast te lijf te gaan in 2001 een aantal speciaal hiervoor ontwikkelde bruistabletten in het water gegooit. Mogelijk heeft het voorkomen van het grote aantallen juveniele exemplaren en het afwijkende exemplaar hier iets mee te maken?



Bij deze juveniele kamsalamander uit Hulst is achter de kop is een extra, sterk gereduceerde poot zichtbaar. Foto: Alex Wieland

DE 'PADDENVLIEG'

Ingo Janssen

Tijdens het beschrijven van het telgebied van Rob Geraeds, op de Meinweg in Midden-Limburg, vonden we een pad die was geïnfecteerd door de paddenvlieg, (*Lucilia bufonivora*). De bewuste pad viel op doordat hij op deze zeer warme dag overdag

actief was en in een poel verbleef. Toen de pad eenmaal vlakbij de oever was hebben we hem gepakt en goed bekeken: De snuitpunt van het dier zag er wat opgezwollen uit, waarbij vooral opviel dat de neusgaten vergroot waren. In de neusholtes



*Het lijktje van een gewone pad op de Meinweg. Uit het neusgat kruipt zojuist een net verpopte paddenvlieg, *Lucilia bufonivora*. Foto: Bart van Opzeeland*