

VREEMD WEER GEEFT VREEMDE COMBINATIES

Net als vorig jaar, was ook dit jaar een heel vreemd voorjaar wat het weer betreft. Hoewel het in maart en april overdag steeds lekker zonnig weer was, waren de avonden veelal koud en droog. Geen ideaal weer voor de amfibieën-trek. Gevolg was dat de vroege soorten, zoals de bruine kikker en de gewone pad verspreid over het gehele voorjaar tevoorschijn kwamen en het voortplantingsseizoen van deze 'explosive-breeders' behoorlijk werd opgerekt. Zodanig zelfs dat er nog ver in april roepende mannetjes gewone pad werden gehoord en er zelfs nog eiafzet plaatsvond. Bijkomstig verschijnsel was dat we twee meldingen binnen kregen van een rugstreeppad die 'het' met een gewone pad deed. Normaal gesproken een ondenkbaar verschijnsel, omdat de gewone pad

over het algemeen al lang en breed klaar is met de voortplanting (uiterlijk eerste week april) als de rugstreeppad net begint (op zijn vroegst laatste week april).

Tom van der Meij vond zijn gemengde koppeltje op 22 april, in zijn telgebied in de duinen van Meijndel (Zuid-Holland). Dit gemengde koppeltje bestond uit een mannetje rugstreeppad en een vrouwtje gewone pad. Het tweede geval betrof een waarneming uit de duinen bij Castricum (Noord-Holland). Waar Stephan Huijgens, op 17 april, ook een vrouwtje gewone pad zag die een mannetje met zich mee zeulde. Bart van Opzeeland maakte van dit laatste koppeltje onderstaande foto.

In beide gevallen was er (nog) geen sprake van eiafzet.



Foto: Bart van Opzeeland

Kruisingen van rugstreeppad en gewone pad zijn een zeldzaam verschijnsel. Juist omdat de voortplantingsseizoenen veelal strikt gescheiden verlopen en ook de voorkeur voor het voortplantingsbiotoop weinig overlap vertoont. Toch zijn uit de literatuur wel enkele van dergelijke hybridisatiepogingen bekend. Wanneer het een mannetje gewone pad en een vrouwtje rugstreeppad betreft zijn de eieren in geen geval levensvatbaar. Is

het mannetje echter een rugstreeppad en het vrouwtje een gewone pad, zoals in bovenstaande gevallen, dan is er wel een hoge sterfte onder de eieren, larven en juvenielen, maar is het evengoed mogelijk dat enkele van de hybriden wasdom bereiken. Erg oud worden ze echter niet. In een Brits laboratorium werd de oudste hybride slechts vijf jaar oud.