


Inventariseren

Valkuilen bij inventariseren kunnen voor grote verrassingen zorgen. Vooral daar waar het aantonen van rugstreeppadden i.v.m. de Flora- & faunawet van groot belang is moet een waarneming zo hard mogelijk zijn. Geluid is in de praktijk niet altijd betrouwbaar gebleken. Zo hoorde ik eens met zekerheid het geluid van een roepende rugstreeppad in een gebied waardoor de rechter de bouwwerkzaamheden waren gestopt omdat een actiegroep zeker wist dat er rugstreeppadden zouden voorkomen. Hoewel ik daar om de hoek woon had ik nog nooit een rugstreeppad horen roepen in een periode van 25 jaar. De actiegroep loog maar de omgekeerde bewijslast dat het beest er niet zat was moeilijk te leveren mede omdat er jaren geleden een betrouwbare waarneming gedaan was. Deze situatie is eigenlijk standaard voor geheel west Nederland. Een niet te monitoren en zich zelden door geluid manifesterende minimale rugstreeppadden stand lijkt overal wel aanwezig. Bij een optimaal biotoop aanbod leeft deze populatie binnen enkele jaren sterk op. Welnu, op een zwoele avond trok ik er een uur na zonsondergang op uit. Ik hoorde een rugstreeppad maar door de gevoeligheid van het plangebied wilde ik het beestje zien. Hij zat te roepen vanuit een ontwateringgreppel tussen twee gebouwen. Na wat klauter werk sloop ik tot vlakbij de plek van waaruit het geluid klonk. Echt rugstreeppadden geroep. Toen ik er zowat bovenop stond bleek het een af en toe aanlopende lucht ventilator te zijn die een perfect rugstreeppadden geroep imiteerde. Wees nauwgezet in je waarneming bij probleem situaties waarbij het er zeer toe doet om de aanwezigheid van de rugstreeppad vast te stellen.



Drie ontwikkelingsstadia

Dat er afhankelijk van het weer type in voorjaar, hoogzomer en nazomer meerdere voortplantingsperioden voorkomen is bekend, maar het blijft raar en bijzonder dat er drie verschillende keren eisnoeren worden afgezet binnen één seizoen bij een steeds wisselende voortplantingsplas te zien zijn. Dit zag ik enige jaren geleden in het westelijke havengebied op het terrein bij de ADM-haven. Onder door mij neergelegde planken zaten adulte, subadulte en juveniele rugstreeppadden en in de plassen die weer waren ontstaan door regenval in augustus zwommen net uitgekomen larven en grote larven in een het stadium waarbij de eerste aanzet tot achterpootjes zichtbaar is. Dit zelfde fenomeen doet zich ook in 2006 voor. Nu op 8 september jl. zwemmen er nog steeds niet geheel gemetamorfoseerde larven van de rugstreeppad in enkele regenplassen die ontstaan zijn in de zeer natte augustus maand maar ook in een afwateringsloot. Na de grote bulk kikkervisjes van begin mei is het opvallend om te constateren dat de voortplanting in hoog en nazomer veel kleiner van aard is. Dat is in een ondiepe regenplas makkelijk vast te stellen omdat je een schatting van het aantal kan maken. Begin juli telde ik in een plas zo'n 4000 larven Naar ik aanneem van slechts twee vrouwtjes en in augustus, nadat alle larven waren gestorven vanwege opdrogen van de plas, zo'n 5000 larven dus van ± 3 vrouwtjes. De grote vraag was voor mij: "Zijn rugstreeppadden in staat om drie keer per jaar eieren te produceren of zijn het vrouwtjes die gescheiden in tijd en plaats opportunistisch gebruik maken van plotseling ideale omstandigheden en daardoor aan een perfecte risico spreiding voor de soort doen?" Dat laatste is ook bekend van een Duitse studie.

Late eiafzettingen

Dit jaar hebben we vaker berichten ontvangen van late eiafzettingen van rugstreeppadden. Zo mailde Leo Bot uit Terschelling het volgende: "Op zaterdag 26 augustus jl. kwam ik op de Noordvaarder tussen jonge duinen (km-hok 141-596) een plas tegen met daarin naar schatting 5000 larven van de rugstreeppad. De larven waren nog heel klein, wat geen wonder is, daar de plek ongetwijfeld in juli geheel droog moet hebben gestaan. Pas de eerste dagen van augustus is hier een 40 mm regen gevallen. Op de terugweg vond ik, eveneens tussen jonge duintjes (km-hok 142-596) nog eens ca 500 larven. Ik weet dat de rugstreeppad flexibel is, maar door de omstandigheden wordt het nu wel een heel laat voortplantingsseizoen!"

Gerard Smit schreef op de ravnwm@yahoo.com dat de rugstreeppadden in zijn buurt vanaf eind april continu actief zijn geweest, met uitzondering van de koudste weken: "In juni en juli zijn het niet meer dan 1, 2 of 3 dieren die roepen. Ze beginnen vaak al in de middag. In tegenstelling tot de piekperiode eind april roepen de dieren met veel tussenpozen. De dieren roepen niet alleen, er zijn ook recent nog eisnoeren afgezet, althans in een nieuw gegraven sloot ontdekte ik kleine larven die ongeveer een week oud zijn." Gerard is benieuwd of er meer mensen zijn die dit jaar ervaren hebben dat het voortplantingsseizoen over een langer periode wordt uitgesmeerd, je kan Gerard mailen op: gerard.smit@hccnet.nl.