

TIPS voor MONITOREN

Voordat je het veld ingaat om amfibieën te monitoren moet je twee dingen goed weten:

1. welke soorten komen op de plot voor, of komen er misschien voor;
2. welke van die soorten soorten zijn nu, dus in deze periode en op dit dagdeel, actief.

Dan weet je dus precies waarnaar je moet kijken, en kun je bij elk watertje die soorten stuk voor stuk onder de loupe nemen.

Welke soorten er voorkomen of misschien voorkomen weet iedereen wel. En anders trek je aan de bel!

Moeilijker het om de beste tijd en het beste dagdeel te pakken om de soorten van je plot te vinden en om ook nog eens de aantalsklasse correct te bepalen.

Er zijn handige tabelletjes waarin dat overzichtelijk staat. Zie bijvoorbeeld de Meetnet Amfibieën Mededelingen 16; maart 2005. En ook in de handleiding staat een overzichtelijke tabel. Hier alles nog eens op een rijtje, per soort, te beginnen bij de soorten waarvoor je al vroeg in het jaar op pad moet

MAART

Bruine kikker: paart meestal in maart. In die periode zijn de aantallen ook het best te schatten, aan de hand van kwakende mannetjes. Dat zal dus 's avonds moeten gebeuren. Ook eiklompjes tellen is effectief en dat kan overdag, niet te lang wachten, soms verdwijnen de eiklompjes snel.

Heikikker paart ook in maart. Verder geldt hetzelfde als voor de bruine kikker. De paarroep is heel karakteristiek en daarvoor moet je 's avonds op pad. Ook eiklompjes tellen kan. Alleen wordt het ingewikkeld op plekken waar

heikikker en **bruine kikker** samen voorkomen. Zie hiervoor Meetnet Amfibieën Mededelingen 18; maart 2006: Eiklompjes tellen.

Gewone pad: paart in maart en is dan massaal in het water te zien, dus ook weer avondwerk.

APRIL

Salamanders: alle salamanders zijn in april goed waar te nemen, inclusief de **vuursalamander**. Het is leuk om ze 's avonds met een lamp te spotten. Overdag zijn ze moeilijker te zien. Wat wel overdag mogelijk is: vangen met schepnet of eitjes tellen. Vooral voor **kamsalamanders** werkt dat heel erg goed.

In april beginnen ook de zomersoorten al van zich te laten horen, zoals **Boomkikkers** en **rugstreeppadden**, zie daarvoor bij mei.

MEI

Rugstreeppadden, boomkikkers, groene kikkers en de Limburgse padjes:

geelbuikvuurpadjes en **vroedmeesterpadjes**

Al deze soorten zijn heel goed te herkennen aan hun roep, dat meestal al klinkt in de middaguren en 's avonds en zijn daaraan ook het best te schatten qua aantallen.

JUNI-JULI juvenieltjes

Het is erg leuk om ook eens aandacht te besteden aan het succes van de voortplanting, dus dat je gaat zoeken naar gemetamorfoserende diertjes. Overdag!

Dat kan vanaf eind juni, dan kom je wel padden- of kikkerregens tegen, vooral van **gewone pad** en **bruine kikker**, maar ook kun je al kleine **rugstreeppadjes** zien. Jonge **salamandertjes** vind je meestal ergens onder, boomstam, grote steen, stuk plaat.

Het afgelopen jaar, in 2007 was de **rugstreeppad** paaraactief van april tot en met augustus. Op eenzelfde moment kon je de padden horen kwaken, waren er grote en kleine rugstreeplarfen en werden verse eieren gezien, en waren er al gemetamorfoserende padjes. Een echte pionier die rugstreeppad. Zie ook pagina 15.

LET OP TEKEN !!

Juveniel groen kikkertje op de oever ergens in de Achterhoek.

