

Wintervissen op de rivierdonderpad in Limburg

(Tekst: J. Kranenbarg; foto's: T. Belgers, J. Kranenbarg)

*In een eerder nummer van de nieuwsbrief (Jaargang 1(1)) is ingegaan op het recente inzicht dat er zich in Nederland twee soorten rivierdonderpad bevinden, namelijk *Cottus perifretum* (rivierdonderpad) en *Cottus rhenanus* (beekdonderpad). De beekdonderpad is in Nederland zeer zeldzaam en lijkt nog slechts geïsoleerd in enkele snelstromende beken voor te komen. De rivierdonderpad is wijd verspreid en komt over heel Nederland voor in zowel stromende als stilstaande wateren. In de periode 1990-1999, tijdens de inventarisaties voor de vissenatlas van de Limburgse beken, kwam de rivierdonderpad veelal alleen in het mondingsgebied van de beken voor. Het lijkt erop dat deze soort zich, mede door het opheffen van migratiebarrières, ook verder stroomopwaarts in de beken gevestigd heeft. Om de kolonisationsnelheid en -afstand te onderzoeken zijn in 2007 een aantal excursies georganiseerd. Hieronder volgt een verslag van de excursie op 22 december 2007 in het stroomgebied van de Tengelroysche beek. De excursie werd georganiseerd door de vissenwerkgroep van het NHGL en RAVON.*

Na een week van mistig waterkoud weer begon het weekend helder. Onderweg bescheen de zon de bevroren weilanden en de witgerijpte bomen. Op het verzamelpunt bij de brug over de Neerbeek stond ondanks de kou reeds een grote groep mensen te wachten. Gezien de grote opkomst verdeelden we ons in twee groepjes van een man of acht. De eerste groep viste in het benedenstroomse gedeelte. De tweede groep begaf zich naar een drietal trajecten verder stroomopwaarts. Het eerste traject dat ons groepje beviste leek weinig op te leveren. Enkele riviergrondeltjes en wat biermpjes wisten we tussen de takken en verrotte bladeren vandaan te halen. Toen was daar opeens toch een rivierdonderpadje. Tot op 6 kilometer van de benedenloop bleek er dus in ieder geval kolonisatie te hebben plaatsgevonden! Ook werden er nog een aantal blankvoortjes, twee snoekjes en een zeelt gevangen. Na ons gewarmd te hebben aan koffie, soep en de ezeltes ter plaatse vertrokken we naar de volgende locatie. In de hier gelegen vistrap was het meteen raak. Ook hier zat de rivierdonderpad! Er werden negen exemplaren gevangen. Alle exemplaren waren over de gehele zijlijn ruw zodat vastgesteld kon worden dat het hier, net als op de vorige locatie, *Cottus perifretum* betrof. Hiernaast werden ook blankvoorn, rietvoorn, brasem, en kolblei gevangen. Op de laatste locatie die we bevisten werden geen rivierdonderpadden meer waargenomen. Wel werden hier nog bittervoorn, rietvoorn,

blankvoorn, riviergrondel en de driedoornige- en tiendoornige stekelbaars gevangen.

Lijkt het je leuk om ook eens in Limburg te gaan vissen, kijk dan in de visagenda. Dit voorjaar wordt er in ieder geval nog één excursie georganiseerd.

