


Ringslang bezoekt trajectloper

Al enkele jaren worden in de Weerribben vier ringslangtrajecten gelopen, slangen worden mede door de aard van het landschap slechts mondjesmaat waargenomen. Daarom



is het des te leuker dat Tjalien Muis op en rond de composthoop bij haar eigen huis, dit jaar maar liefst 8 volwassen ringslangen heeft gezien. Tijdens het omzetten van de broeihoop werd duidelijk dat er nog veel méér slangen op bezoek zijn geweest. Er werden namelijk ± 500 eidoppen geteld. Dat zijn de eieren van naar schatting 30 vrouwtjes !!! De drie dode jonkies die zijn gevonden, twee op de weg en één in de grasmaaier, vormen maar een fractie van de nieuwe aanwas. Een goed voorbeeld derhalve van wat een goed aangelegde broeihoop kan betekenen voor de ringslang. Tjaliens bericht geeft aan dat de ringslang in de Weerribben wellicht in hogere dichtheden voorkomt dan tot nu toe aangenomen werd.

2001: Goede voortplanting gladde slang

clusters

In Nieuwsbrief 19 was te lezen hoe de jonkies van de gladde slang na koele/natte zomers relatief laat in het jaar geboren worden en dan de gewoonte hebben om gedurende dagen of weken in een kluwen bij elkaar te blijven. Waarschijnlijk om te profiteren van elkaars warmte. Dit jaar was dat niet het geval. Op 30 augustus brachten we een bezoek aan de trajecten van Peter Keijsers in de Peel.

geen clusters

We konden met eigen ogen zien dat de jonkies dit jaar niet clusteren. In totaal zagen we naast zeven adulte dieren ook zeven juvenielen die allen eenzaam en alleen over de Peel zwierven. Uit het Fochteloërveen ontvingen wij dezelfde berichten. Een goed gladde slangen jaar derhalve. Goed voor de slangen, minder voor de waarnemer want clusters zijn veel gemakkelijker te vinden dan een enkel jonkie!



*Cluster juveniele gladde slangen op de Kalmthoutse heide (B) in 2000.
Foto: Arnold van Rijsewijk*