

MKZ laat sporen na

De MKZ-crisis van het afgelopen voorjaar heeft serieuze gevolgen gehad voor ons meetnet. Een analyse van de reeds ingevoerde trajecten laat zien dat 1 op de 3 trajecten in meer of mindere mate last heeft gehad van de MKZ perikelen. Van de 196 trajecten waarvan we nu gegevens binnen hebben, zijn er 14 (7%) in verband met MKZ niet gelopen. Op 52 trajecten (27 %) is in verband met MKZ minder vaak gelopen. Het zwaartepunt van de getroffen trajecten ligt, zoals te verwachten was, in Gelderland en Overijssel, hier werden 5 trajecten niet gelopen terwijl

17 trajecten minder vaak bezocht zijn. Ook in het Noorden vielen enkele belangrijke trajecten uit; zo is er in het Fochteloërveen op 4 van de 5 trajecten niet gemonitord. Op de Drentse trajecten was de MKZ-invloed ook merkbaar, op 8 trajecten werd niet of minder vaak gemonitord. De meeste van deze trajecten liggen in begraasde terreinen. In de rest van het land zijn de gevolgen van MKZ minder hard aangekomen, vooral de trajecten in de

randstad laten nauwelijks MKZ-gaten zien, ook de trajecten in de duinen zijn relatief goed gemonitord.

Gladde slang vaak laten liggen, ook door broedgeval kraanvogel

Het meetnet van de gladde slang lijkt het zwaarst getroffen; op maar liefst 15 van de 25 trajecten (60%) waar deze soort voorkomt is er door MKZ niet of minder vaak gemonitord. Hierbij dient echter wel opgemerkt te worden dat voor deze soort de maanden juli tot en met september het

belangrijkst zijn, de MKZ crisis was in die periode verleden tijd.

Vermeldenswaard is de situatie van enkele trajecten in het Fochteloërveen die eerst niet bezocht konden worden vanwege MKZ en daarna onbereikbaar waren vanwege het eerste, succesvolle, broedgeval van de kraanvogel in Nederland sinds mensenheugenis!

Het hazelwormenmeetnet had ook veel te lijden van MKZ, maar liefst 43% van de trajecten waarop deze soort voorkomt had in meer of mindere mate hinder van de MKZ-crisis.

De adder is op 22 van de 57 trajecten (39%) niet of minder goed gemonitord. Omdat de voorjaarstellingen voor deze soort belangrijk zijn lijkt het addermeetnet zwaar getroffen door MKZ. Maar dit zal pas echt duidelijk zijn als de analyses uitgevoerd zijn. De levendbarende hagedis laat een soortgelijk patroon zien als bij de adder, met wie hij vaak samen voorkomt; 37 % van de trajecten met deze soort lieten MKZ-invloed zien.

Het zandhagedismeetnet heeft minder onder vuur gelegen. Het leeuwendeel van de trajecten met deze soort is gelegen in de duinen waar de MKZ-maatregelen minder waren dan elders. In de duinen kon de zandhagedis dan ook meestal goed gemonitord worden, hoewel ook hier de invloed van MKZ merkbaar was, zeker op de trajecten waar begrazing plaatsvindt.

Het ringslangmeetnet heeft het minste last gehad van MKZ, een groot deel van de trajecten met deze soort liggen in het westen van het land én buiten de natuurgebieden waardoor de ringslang vergeleken met de andere soorten goed gevolgd kon worden.

GEEN TOEGANG

Ter voorkoming
van verspreiding van

Mond- en Klauwzeer

is dit natuurgebied
voor publiek gesloten.

art. 461 W.v.S.

Mond- en Klauwzeer kan ook door
mensen verspreid worden.
Het is onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid om de dieren
in dit natuurgebied te beschermen.

Invloed van
MKZ op de
meetnetten
van de
afzonderlijke
soorten.

soort	trajecten 2001				
	routes met gegevens	normaal bezocht	minder goed bezocht	niet bezocht	MKZ invloed
gladde slang	25	10	10	5	60%
hazelworm	40	23	15	2	43%
adder	57	35	19	3	39%
lev. hagedis	100	63	29	8	37%
zandhagedis	101	70	26	5	31%
ringslang	62	50	10	2	19%