

Broeihoop geplunderd door bunzing?

Jelle Hofstra.

Ringslangen worden belaagd door tal van dieren. Vooral wat betreft jonge ringslangetjes. Als zodanig worden als predator vogels genoemd: kraaiachtigen, roofvogels, ooievaars, reigers, fazanten en zelfs loslopende kippen. Op de golfbaan te Beetsterzwaag (Fryslân) zag de beheerder enkele jaren terug steeds een buizerd vanuit een boom nabij een broeihoop omlaag vliegen om vele pasgeboren ringslangetjes te pakken die uit de bladhoop kropen. ringslangen kunnen ook worden doodgebeten door egels en dassen. Dit laatste bleek in het Friese Oldeberkoop. Hier werden volwassen gedode ringslangen gevonden met dassenprenten erbij. Ook komt predatie voor in een al veel vroeger stadium. Namelijk het roven van eieren. Het is o.a. van de vos bekend dat die eieren eet van bijvoorbeeld de zandhagedis (Floor van der Vliet, Nieuwsbrieven 1 en 2; Anton van Kreek, Nieuwsbrief 19). Dat ook ringslangeieren door 'rovers' worden belaagd werd in 1999 door mij geconstateerd bij het inspecteren van een broeihoop nabij de golfbaan te Beetsterzwaag op 18 juli. In de

overwegend uit beukenblad bestaande hoop waren tal van gangen gegraven met een doorsnede van ongeveer 7-8 cm. Sommige gangen leidden regelrecht naar een cluster eieren. Op de bladhoop zelf lagen ook her en der eieren verspreid. De meeste eieren waren aangevreten, maar sommige waren nog intact. De onbeschadigde eieren zijn thuis in een broedstoof geplaatst en met succes uitgebreed. De beschadigde eieren werden van de broedhoop verwijderd en de gangen gedicht. Bij een volgende inspectie op 27 augustus waren er echter opnieuw gangen gegraven en lagen er ook nu weer eieren in de buurt (zie foto). Gezien de doorsnede van de hollen moet de predator of een bunzing zijn, of een bruine rat. De bruine rat maakt hollen met een diameter van 6-9 cm. Beide gangen zijn dan ook moeilijk of niet van elkaar te onderscheiden, volgens Annemarie van Diepenbeek in haar veldgids 'Diersporen'. Gezien de omgeving waar de broeihoop ligt, houd ik het voorlopig echter maar op een bunzing. Het zal duidelijk zijn dat het broedsucces dat jaar beduidend minder was dan voorgaande jaren.

Foto van de bladhoop op 27 augustus 1999. Rondom het gat waar de predator is binnengegaan liggen tal van ringslangeieren die al zijn uitgekomen. Foto: Jelle Hofstra

