



Wroeten in broeihopen

Het najaar is dé tijd om te kijken hoe de broeihopen het afgelopen jaar hebben gefunctioneerd. Zo ook in Loenen a/d Vecht waar we nu al enkele jaren de ringslang monitoren. In dit terrein van Gemeente Waterleiding Amsterdam ligt een hele grote hoop (± 35 bij 5 m en ongeveer 3 m hoog) maaiafval, afkomstig uit het terrein. Op dinsdag 4 november togen wij (Annie, Axel, Ingo en twee studenten van de UvA) naar Loenen

om deze broeihoop te inspecteren. Al gravend en wroetend kwamen we tot een totaal van 309 eieren én twee kleine watersalamanders. Uitgaande van zo'n 15 eieren per vrouwtje, hebben ± 20 vrouwtjes hun eieren hier afgezet.

Drenthe

Uit het Fochtelooërveen kwam een melding van maar liefst 1222 eieren verdeeld over twee hopen. Sibert Hoeksma vond er 1000 in de ene hoop en 222 in de andere. Daar moet het eind juni een file geweest zijn van vrouwtjes die eieren kwamen leggen!

Andries van der Veen houdt pasgeboren ringslangetje vast

Van Richard Pijl ontvingen we wel een heel bijzonder bericht: *Begin juli werd nabij Boekesteijn (NM, het Gooi) een lading houtsnippers afgeleverd. De snippers waren afkomstig van de gemeentewerf, die grenst aan de Kortenhoefse plassen, waar ze al een tijdje lagen. Een knijper neemt er daar een hoop vanaf, en vervoert het per vrachtwagen naarj Natuurmonumenten waar het op 2 juli werd afgeleverd. Bij het verspreiden van de snippers kwam een klont van 7 ringslangeieren tevoorschijn. In de veronderstelling dat het niets meer zou worden hebben we ze (de eieren) bij het bezoekerscentrum Boekesteijn ingeleverd; als decoratiemateriaal.*

Leuk voor het publiek.

In het bezoekerscentrum zijn ze in een plastic potje gedaan en op een plank neergezet. Een van de medewerkers van het bezoekerscentrum ontdekte op 18 augustus dat er vier jonge ringslangen rondkropen in het potje, vier van de zeven eieren waren dus uitgekomen! Na van de verbazing te zijn bekomen hebben we de jonge ringslangetjes vrijgelaten op de monitoringsroute op Boekesteijn omdat we op die route ook wel eens jonge ringslangetjes tegenkomen, die daar van nature voorkomen.

Kennelijk was deze lange en warme zomer warm genoeg om de eieren in het potje uit te laten komen.

De temperatuur tijdens de drie zomermaanden van 2003 ligt een stuk boven normaal

