





## HERKENNING VERVELLINGS VAN SLAGEN

Vervellingen van reptielen zijn vaak goed op soort herkenbaar. Slangen slijpen hun oude huid binnenste-buiten en in één geheel af. Deze 'huangenhuid' zijn op de onderstaande tekeningen te determineren. Ze zijn gelyk van kleur, half transparant en worden gevonden in lage vegetatie, onder stukken hout of plode stenen, tussen steenhopen, van ringaling ook op riviere.


Vorm en grootte van de kopschubben zijn kenmerkend voor de soort. Meestal zijn deze ook in het slangenband nog goed herkenbaar.



tekeningen: Adder: uit De Adder, A. Anseling, 1993; Dierstroom; Ringlang en Gladde slang: uit La Guía de los anfibios y reptiles de la península Ibérica, Islas Baleares y Canarias, L. Barbadillo Escoria, 1997 Inciso, Madrid; foto's: Auteursrechten voor Dierstroom



Boven: tekening van de kopschubben bij de ringlang, daarnaast de afgestroopte huid van de kop. Onder: tekening van de kopschubben van de gladde slang met daarnaast de afgestroopte huid van de kop.



## HERKENNEN VAN VERVELLINGS

### Slangen

Adder en ringslang hebben gekielde rugschubben, dat wil zeggen dat over de schubben een lengteribbel loopt. Ook bij een vervelling is dit goed zichtbaar. Gladde slangen hebben gladde rugschubben. Bij de afgestroopte huid van een adder blijft de zigzagtekening bijna altijd goed zichtbaar. Verdere identificatie is mogelijk met de vervelling van de kop. Vorm en formaat van de kopschubben van de adder verschillen duidelijk van die van ringslang en gladde slang.

### Hagedissen

Afgeworpen huiden van hagedissen zijn relatief klein en meestal vind je alleen flarden van de oude huid. Hagedissen hebben meerdere rijen schubben over de buik lopen terwijl slangen maar één brede rij heeft. Zo is de hazelwormvervelling goed te onderscheiden. Ook zijn bij de hazelworm de buik- en rugschubben van gelijke grootte. Bij de zandhagedisvervelling blijft het geblokte patroon op de rug en flanken meestal zichtbaar en de rugschubben zijn in het midden duidelijk smaller. Bij de levendbarende hagedis zijn de rugschubben van gelijke breedte.

*Het RAVON heeft twee zogenaamde herkenningsschema's (zie hierboven) samengesteld waarop de kenmerken voor het identificeren van vervellingshuiden van slangen en hagedissen helder staan weergegeven. Deze*



## NIEUWE STANDAARDLIJST VOOR DE NEDERLANDSE NAMEN VAN DE EUROPESE AMFIBIEËN EN REPTIELEN

Onlangs verscheen in het RAVON tijdschrift de nieuwe standaardlijst met Nederlandse namen. Henk Strijbosch en andere herpetologen uit Nederland en Vlaanderen hebben de Nederlandse namenlijst voor de Europese herpetofauna opnieuw vastgesteld. De vorige lijst dateert van 15 jaar geleden, sindsdien zijn nogal wat nieuwe soorten beschreven. Wat betreft de Nederlandse soorten verandert er weinig; alleen de middelste groene kikker heet van nu af aan "bastaardkikker". De standaardlijst is als PDF te downloaden via [www.ravon.nl](http://www.ravon.nl).