

Deze twee vondsten zijn opmerkelijk, omdat uit ons land slechts twee oude waarnemingen bekend zijn van deze soort. Beide dateren van rond 1900: Meerssen (november, Kempers, 1 ex.) en Valkenburg (Rüschkamp, 2 exx.), beide in Museum Naturalis te Leiden.

Een mogelijke derde vondst, die door ons niet gecontroleerd kon worden, meldt Everts (1898) onder de naam *H. erichsoni* Bach: Blijenbeek bij Roermond.

Volgens Angus (1992) wordt *H. longitarsis* gevonden in klei- of mergelpoelen. Dit lijkt in overeenstemming met de Nederlandse waarneming uit Eijsden. Het is denkbaar dat het exemplaar uit Obbicht uit een kleipoel in de Maas-uiteerwaard uitgespoeld is.

Helophorus longitarsis is een zuidelijke soort die door heel Midden- en Zuid-Europa voorkomt, maar ontbreekt in de Scandinavische landen, Denemarken en het noorden van Duitsland (Angus, 1992; Köhler & Klausnitzer, 1998). De vindplaatsen in Limburg bevinden zich dus aan de noordrand van het areaal. In Centraal-Europa is de soort zeldzaam en zijn zeer weinig recente waarnemingen bekend (Horion, 1949; Köhler & Klausnitzer, 1998). Hebauer (1989) meldt een aantal vondsten uit het Oostenrijkse Burgenland. Uit België zag de eerste auteur slechts één vondst: Bombaye (25.vii.1925, 1 ♂, 4 ♀, Museum Brussel). Deze locatie is gelegen op circa vijf km afstand van de recente Nederlandse vindplaats in Mariadorp. In Groot-Brittannië

is *H. longitarsis* beperkt tot het zuidelijke deel van het land, ten zuiden van de lijn Norfolk – Gloucestershire (Kevan, 1966).

Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat *H. longitarsis* op meer plaatsen in Zuid-Limburg gevonden kan worden. Voor de determinatie van de soort wordt verwezen naar Drost et al. (1992).

Literatuur

- ANGUS, R. B., 1992. Insecta: Coleoptera: Hydrophilidae: Helophorinae. – *Süßwasserfauna von Mitteleuropa* 20 (10-2): i-xi, 1-144.
- DROST, M. B. P., H. P. J. J. CUPPEN, E. J. VAN NIEUKERKEN & M. SCHREIJER (eds), 1992. *De waterkevers van Nederland*: 1-280. Uitgeverij KNNV, Utrecht.
- EVERTS, E., 1898. *Coleoptera Neerlandica* I: i-viii, 1-676. M. Nijhoff, 's-Gravenhage.
- HEBAUER, F., 1989. Familienreihe Hydrophiloidea (Palpicornia). In: *Die Käfer Mitteleuropas*, 1. Supplementband mit Katalogteil (G. A. Lohse & W. H. Lucht eds): 72-92. Goecke & Evers, Krefeld.
- HORION, A., 1949. *Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer. Band II. Palpicornia - Staphylinoidea (ausser Staphylinidae)*: iii-xxiii, 1-388. Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main.
- KEVAN, D. K., 1966. The British species of the genus *Helophorus* Illiger, subgenus *Helophorus* s. str. (Col., Hydrophilidae). – *Entomologist's Monthly Magazine* 101: 254-268.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (eds), 1998. Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – *Entomologische Nachrichten und Berichte*, Beiheft 4: 1-185.

Bas Drost, Lingedijk 35, 4014 MB Wadenoijen.

Oscar Vorst, Poortstraat 55, 3572 HD Utrecht.