

tussen Duin & Dijk



Natuur in Noord-Holland. Jaargang 5 1 ● 2006

Nieuwsflits



● De op het Texelse strand gevonden Evervis is bijna 10 cm lang. Foto: Ecomare, Salko de Wolf.

Zeldzame vis op Texelse strand: Evervis

Vinders Nienke en Jan Ravenstijn wisten niet wat ze zagen en gingen ermee naar Ecomare. Volgens Pierre Bonnet, bioloog bij Ecomare, is deze soort nooit eerder op het Nederlandse strand gevonden. Evervissen lijken op zonnevissen, maar missen de karakteristieke zwarte vlek op het lichaam en hebben ook niet van die lange vinnen. De evervis behoort overigens tot een andere familie die slechts acht soorten telt. Evervissen leven bij voorkeur in diep water (110-400 meter). Zij komen voor ten zuiden van Ierland en Engeland, aan de Atlantische zijde van Het Kanaal. In diep water voeden zij zich vooral met holtdieren. Soms komen zij in zulke grote aantallen voor, dat zij buiten hun zuidelijke verspreidingsgebied tot in de noordelijke wateren doordringen. Hierdoor worden zij ook af en toe in de zuidelijke Noordzee gesignaleerd. Hier eten zij roei-pootkreeftjes en andere kreeftachtigen. De evervis is langs de Nederlandse kust zeldzaam. In 1965 werd een 17 cm lang exemplaar in het Brouwershavense Gat gevangen. In de collectie van Naturalis zijn naast het bovengenoemde exemplaar nog slechts twee andere exemplaren aanwezig die uit de Nederlandse wateren afkomstig zijn. De evervis van Texel wordt binnenkort opgenomen in de collectie van Naturalis.

Meeuwen

Voor de meeuwenliefhebbers heeft de Vogelwerkgroep Amsterdam

een special uitgegeven over de herkenning van eerste kalenderjaar grote meeuwen: zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, geelpootmeeuw en pontische meeuw.

Twee meeuwenspecialisten Mars Muusse en Ruud Altenburg hebben hun kennis, ervaring en veel fotomateriaal gebundeld in deze uitgave. De special is vooral interessant voor vogelaars die geïnteresseerd zijn in de herkenning van deze soorten, maar die hier nooit aan begonnen zijn vanwege de vermeende complexiteit. Aan de hand van uitgebreide beschrijvingen, kleurenfoto's en tekeningen is getracht duidelijk te maken dat de meeste 1e-kalenderjaar vogels zonder problemen te herkennen zijn. De uitgave kan via de website van de VVGA worden besteld.

Recordaantal ringslangen

Het 12^{1/2}-jarig jubileumfeest van de ringslangwerkgroep Groot Amsterdam is afgelopen zomer opgeluisterd met een nieuw recordaantal ringslangeieren. In de Amstelveense Poel en Waterland-Oost zijn nog nooit zoveel eieren in de aangelegde broeihopen aangetroffen. Om een indruk te geven: in de Amstelveense Poel zijn in 4 broeihopen 1505 eieren gevonden, waarvan 1203 zijn uitgekomen en in Waterland-Oost zijn in 2 broeihopen 190 eieren gevonden waarvan 178 zijn uitgekomen. Een uitkomstpercentage van 81 procent! Al met al is 2005 een zeer succesvol jaar voor de ringslang en de werkgroep (informatie: Martin Melchers).

Zuidelijke boomsprinkhaan tot in Den Helder doorgedrongen

De zuidelijke boomsprinkhaan (*Meconema meridionale*) werd in 1992 voor het eerst in Nederland aangetroffen, in het Rijnmondgebied. Sindsdien zijn er vele vindplaatsen in ons land bijgekomen. Op 28 oktober 2005 vond Bert Pijs een vrouwtje van deze bijzondere soort in Den Helder, op de spiegel van zijn auto. Een symbolische vondst, want men neemt aan dat de dieren vanuit hun oorspronggebied in Italië met vakantiegangers zijn meegelift naar noordelijker streken. Alleen was Bert Pijs de hele week niet verder geweest dan Den Helder Zuid. Het is niet verbazingwekkend dat de waarnemingen in Nederland vooral uit steden stammen, omdat het klimaat hier milder is dan in open gebied. De vondst in Den Helder is veruit de meest noordelijke in Nederland en voor zover bekend ook in Europa.

R. Kleukers, Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European Invertebrate Survey / EIS-Nederland.
Postbus 9517, 2300 RA Leiden.
e-mail: kleukers@naturalis.nnm.nl of eis@naturalis.nnm.nl.

● Zuidelijke boomsprinkhaan. Foto: Bert Pijs.

