

tussen Duin & Dijk



Natuur in Noord-Holland. Jaargang 12 3 ● 2013

Nieuwsflits



● Zwarte zee-eend. Foto: Alfred Berkhof.

Recordaantallen zwarte zee-eenden voor de kust van Texel

Kees Camphuysen en Frits Jan Maas tellen bijna dagelijks bij de Hoornderslag en Westerslag op Texel de zeevogels. In mei telden zijn recordaantallen zwarte zee-eenden. Op 5 mei werden er bijna 12.000 waargenomen bij de Westerslag en op 6 mei zelfs ruim 27.000. Kees Camphuysen telde op de Hoornderslag op 13 mei 38.355 zwarte zee-eenden en 313 grote zee-eenden, op 14 mei 36.389 zwarte en 1.028 grote zee-eenden en op 15 mei 31.130 zwarte en 366 grote zee-eenden (zie www.trektellen.nl). Op 16 mei werden maar liefst 51.070 zwarte zee-eenden waargenomen. De voedselomstandigheden moeten bijzonder gunstig geweest zijn, omdat ook veel vogels ter plekke zaten. De laatste decennia zijn zwarte zee-eenden sterk afgenomen. De oorzaak daarvan is dat

● Rietlandwimperzwam.
Foto: Theo Westra.



het stapelvoedsel -strandschelpen *Spisula* - door overbevissing van bodemwoelende visserij sterk is afgenomen. Waar de zwarte zee-eenden bij Texel op foerageerden is niet duidelijk. Mogelijk foerageerden ze op zwaardscheden of een andere onbekende voedselbron, zoals borstelwormen (zagers, zee-pieren). Bron: www.trektellen.nl en www.natuurbericht.nl

Zeldzame rietlandwimperzwam bij Kennemermeer

In het gebied rond het Kennemermeer bij IJmuiden vond Theo Westra in mei een rietlandwimperzwam. Dit is een bijzonder, maar lastig te herkennen schijfzwammetje. Dit zwammetje wijkt af van het gewone wimperzwammetje doordat, anders dan bij het gewone wimperzwammetje, de randharen wit waren en zowel kort als lang. Theo liet de zwammetjes microscopisch nakijken en na nauwkeurig onderzoek bleek het om de rietlandwimperzwam (*Scutellinia umbrorum*) te gaan. Een zeldzame en achteruitgaande soort, bekend van natte gebieden.

Wie goed oplet, komt regelmatig kleine, vaak felgekleurde schijfzwammetjes tegen. Ze groeien op verrot hout, mest of gewoon op de grond; vaak op de staande randen van karrensporen. Veruit de bekendste soort is de gewone wimperzwam (*Scutellinia scutellata*), een grotere soort, tot maximaal een centimeter in diameter. De gewone wimperzwam komt



voor op organisch materiaal, zoals verrot hout. Maar alle schijfjes en zeker de wimperzwammetjes moeten zorgvuldig microscopisch gecontroleerd worden, want er zijn in Nederland meer dan twintig moeilijk van elkaar te onderscheiden soorten bekend, met bijna allemaal een oranje-rode kleur. Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging op woensdag 5 juni 2013. www.picturetrail.com/theowestra.

Weidevogelbalans

Sovon heeft in juni de weidevogelbalans uitgebracht. De conclusie is dat de kenmerkende soorten van het boerenland als grutto, Kievit, scholekster en veldleeuwerik sinds 1990 een sterke achteruitgang laten zien. De laatste vijf jaar lijkt de trend voor enkele soorten ten positieve te veranderen. Grutto en Kievit zijn in die periode licht toegenomen en tureluur en veldleeuwerik gaan niet meer zo hard achteruit. Van een echte langjarige kentering in de ontwikkeling van de weidevogelstand is echter nog geen sprake. In het verleden is de achteruitgang namelijk al eens eerder onderbroken door een korte opleving. Toch geven deze gegevens hoop en het lijkt dat inspanningen van boeren om later te maaien en waterpeil op te zetten, zoals in de Bovenkerkerpolder en de Ronde Hoep, positief kunnen uitpakken voor de weidevogels. Meer lezen: www.kenniscentrumweidevogels.nl en www.sovon.nl.