

tussen Duin & Dijk



Natuur in Noord-Holland. Jaargang 13 4 ● 2014

Nieuwsflits




● Honingorchis. Foto: Gerrit Welgraven.

Honingorchis na 15 jaar terug aan de Hollandse kust

Na 15 jaar afwezigheid is deze zomer de honingorchis terug in de Noord-Hollandse vastelandsduinen. De vondst werd gedaan op het Kennemerstrand, een jonge duinvallei in Zuid-Kennemerland. De afgelopen jaren was deze soort alleen nog bekend van Lauwersoog. De honingorchis blijft dus in Nederland een zeer zeldzame soort.

De honingorchis (*Herminium monorchis*) werd in de duinen van Zuid-Kennemerland voor de laatste keer in 1999 gevonden. Ook in het Noordhollands Duinreservaat verdween de soort rond die tijd. Ze werd daarna niet meer in de duinen aangetroffen. Sterker nog, de honingorchis werd de laatste jaren in Nederland alleen nog gevonden bij Lauwersoog.

De eerste vondsten werden eind juni gedaan en na een uitgebreide



● Bijeneters. Tekening: Jos Zwarts.

dere zoektocht liep het totaal in de loop van juli op tot 21 bloeiende planten. Bovendien werden tijdens een nauwkeurige inspectie in de buurt van bloeiende planten nog eens 13 rozetjes gevonden. Gezien de wijde verspreiding over het gebied zal de soort zich al enkele jaren geleden hebben gevestigd maar is onopgemerkt gebleven. De kleine rozetten en bloemstengels zijn, als je er niet op bedacht bent, erg lastig te vinden in de vegetatie. Werkgroep Europese Orchideeën

Zeldzame broedvogels in Duin en Kruidberg

Deze zomer heeft een paartje grauwe klauwieren gebroed in open duingebied in een meidoorn

en een paartje bijeneters heeft genesteld in de steile rand van een duinmeertje. Begin juni werden een mannetje en een vrouwtje grauwe klauwier ontdekt in Duin en Kruidberg. De grauwe klauwier is een karakteristieke soort voor het open duin. Het laatste broedgeval van grauwe klauwieren in Duin en Kruidberg dateerde uit 1978. Begin augustus werd het vogelechtpaar vaak gespot bij het voeren van hun (twee) jongen. Half juni werden twee bijeneters gezien. Later in juni zag een onderzoeker de bijeneters een nestgang graven in een steile rand langs een duinmeer. Later in augustus bleek dat de nestgang door een vos was ondergraven en dat de aanwezige jonge vogels door een vos waren opgegeten.

Plaatsstrouwe tapuit maakt bescherming lastig

Tapuiten blijken bijzonder plaatsrouw en dat maakt de kleine resterende tapuitpopulaties zoals die in de Noorduinen extra kwetsbaar. Per resterende populatie zijn specifieke maatregelen nodig om het voortbestaan van deze ernstig bedreigde vogelsoort in Nederland veilig te stellen.

Afgelopen jaar luidde Vogelbescherming Nederland de noodklok voor de tapuit met een themadag voor beheerders, beschermers en onderzoekers en een brochure over de bescherming van de tapuit. In Ibis, een internationaal wetenschappelijk vogeltijdschrift, presenteren Stichting Bargerveen en Sovon Vogelonderzoek Nederland nu belangrijke resultaten van jarenlang onderzoek aan de tapuit, een onderzoek dat deels werd gefinancierd door Vogelbescherming Nederland. Verder lezen: Oosten, H. H. van, C. van Turnhout, C. A. Hallmann, F. Majoor, M. Roodbergen, H. Schekkerman, R. Versluijs, S. Waasdorp & H. Siepel. 2014. Site-specific dynamics in remnant populations of Northern Wheatears *Oenanthe oenanthe* in the Netherlands. On line verschenen: Ibis, doi: 10.1111/ibi.12205

● Grauwe klauwier. Foto: Piet Munsterman.

