

lichter door de velumresten. Lamellen matig wijd uiteen, buikig, breed en iets uitgebocht aangehecht en donkerbruin. Steel 50 x 7 mm, witachtig en bruin verkleurend bij ouderdom, aan de basis met witte velumresten. Geur als van *Hebeloma sacchariolum* vermengd met een raphanoïde component. Sporen 8-9 x 5-6 µm, Q=1.5-1.7, donkerbruin en grof geornamenteerd.

Mirjam Veerkamp

LITERATUUR

- Bas, C., Th.W. Kuyper, M.E. Noordeloos & E.C. Vellinga, 1988. Flora agaricina neerlandica. vol. 1. Rotterdam.
- Bon, M., 1975. Agaricales de la côte Atlantique Française. Doc. mycol. 5(17): 7-11.
- Bremer, P., 1991. Flora, vegetatie en bosverjonging in het Kuinderbos. Uitgave Staatsbosbeheer.
- Kuyper, Th.W., 1990. Het geslacht *Cortinarius* in Nederland - I. Subgenus *Dermocybe*. Coolia 33: 1-7.
- Moser, M., 1983. Die Röhrlinge und Blätterpilze. In H. Gams, Kleine Kryptogamenflora Band. IIb/2. 5. Aufl.
- Noordeloos, M.E., 1987. *Entoloma* (Agaricales) in Europe. Synopsis and keys to all species and a monograph of the subgenera *Trichopilus*, *Inocephalus*, *Alboleptonia*, *Leptonia*, *Paraleptonia*, and *Omphaliopsis*. Beih. Nova Hedwigia 91.
- Phillips, R., 1981. Paddenstoelen en schimmels van westeuropa. Het Spectrum.

BOEKBESPREKINGEN

G. Keizer, 1990. De paddestoelen van de duinen van Oostvoorne, Mildenburg en het Overbosch. 41 pags, 5 bijlagen.

De resultaten van tien jaar intensief inventariseren in het duingebied van het Zuidhollandse eiland Voorne zijn in dit verslag weergegeven en worden vergeleken met gegevens van voor 1980. Drie duingebieden, de duinen van Oostvoorne (inclusief Strijpemonde), het binnenduingebied Mildenburg en het eveneens in de binnenduinen gelegen Overbosch zijn meer of minder vaak bezocht. Van het eerste en grootste en ook meest afwisselende gebied zijn de meeste gegevens bekend; hier zijn ook enkele proefvlakken jaarlijks bezocht. Veel aandacht is besteed aan de voorjaarsfungi.

Per gebied wordt een vergelijking gemaakt tussen verleden (opgesplitst in de perioden 1950-1970 en 1970-1980) en heden (1980-1990). Niet alleen naar de soorten zelf, ook naar de verhoudingen ectomycorrhizavormers : saprofyten : parasieten, de percentages zeldzame soorten en de Rode Lijst-soorten wordt gekeken en de resultaten worden in min of meer overzichtelijke tabellen weergegeven. De verschuivingen die er hebben plaatsgevonden in soortensamenstelling (bijvoorbeeld in de duinen een achteruitgang van het aantal *Cortinarius*-soorten en

van een aantal typische graslandpaddestoelen) worden besproken en mogelijke oorzaken hiervoor aangegeven. Verruiging en een veranderd bosbeheer, waarbij meer dood hout blijft liggen, worden als belangrijke factoren voor de veranderingen beschouwd. Ook in dit duingebied vindt hedentendage begrazing door runderen en paarden plaats, een ingreep die misschien de verruiging tegen zal gaan. Andere beheersmaatregelen om de mycoflora te verrijken worden ook aanbevolen.

In de bijlagen hebben de soortenlijsten een plek gevonden.

Dit verslag is voor allen die geïnteresseerd zijn in de duinen en hun fungi aanbevolen leesvoer.

Het is in de bibliotheek van de NMV aanwezig.

Else C. Vellinga

Kuijs, W.D.J., 1991. De paddestoelen van Schouwen-Duiveland. Verslag van de inventarisatie van de paddestoelen van Schouwen-Duiveland verricht in de jaren 1950-1990. 208 pags. KNNV. f 15,--

Drie jaar geleden verscheen een verslag van de paddestoelenrijkdom van Zuid-Beveland van Wim Kuijs, nu ligt er een even lijvig verslag over de paddestoelen van Schouwen-Duiveland, en voor de nabije toekomst wordt een verslag van Walcheren aangekondigd.

De opzet van het nieuwe verslag is dezelfde als die van Zuid-Beveland; per terrein wordt na een beschrijving een lijst van soorten gegeven met per soort de waarnemingsdatum, het substraat, en wie de soort gedetermineerd en/of bewaard heeft. In aparte hoofdstukjes worden paddestoelen van houtsnippers, van brandplekken en van begraafplaatsen behandeld en wordt een overzicht gegeven van het voorkomen van Moederkoren en Iepziekte. Van enkele soorten worden voor Zeeland verspreidingskaartjes gegeven. Een totaalijst met 781 soorten completeert het geheel. Paddestoeltekeningen van de hand van mw. Kuijs sieren het verslag.

Schouwen-Duiveland heeft zwaar geleden onder de overstromingen in de 40-er en 50-er jaren; in dat licht bezien is het grote aantal gevonden soorten extra opvallend. Het geeft o.a. aan dat gedegen inventarisatieonderzoek zijn vruchten wel afwerpt.

Al met al is het een zeer lezenswaardig verslag geworden, wederom een felicitatie waard; we zien uit naar een volgend deel! Zo wordt Zeeland op paddestoelengebied een goed bekende provincie.

Dit verslag is in de NMV-bibliotheek aanwezig. Het is te bestellen door overmaking van f 21,40 op giro 5719596 t.n.v. W.D.J. Kuijs, Plataanstraat 7 te Goes. Op de nieuwjaarsbijeenkomst is het ook te verkrijgen voor f 15,-- (zonder verzendkosten).

Else C. Vellinga