



EEN VERWARRENDE *TRICHOLOMA* IN OVERIJssel

Marian Jagers

Reelaan 13, 7522 LR Enschede

Jagers, M. 2010. A disturbing *Tricholoma* in the province of Overijssel. *Coolia* 53(2): 95–96.

The *Tricholoma aurantium* found on the Lonnekerberg in the province of Overijssel, September 2008, turned out to be *Tricholoma psammopus*.

In *Coolia* 52(1) 2009 werd een viertal soorten bijzondere paddenstoelen gemeld, gevonden op de Lonnekerberg te Enschede begin september 2008 (Jagers, 2009). Een ervan werd, na suggestie van Nico Dam, *Tricholoma aurantium* genoemd, Oranje ridderzwam. Het ging om een fors exemplaar dat in een bosrand groeide waar eik, beuk, spar en lariks dicht opeen staan. *T. aurantium* wordt in de literatuur getypeerd als een oranje-rood gekleurde paddenstoel waarbij de hoed, in vochtige omstandigheden, voorzien is van een slijmerig laagje. De gevonden ridderzwam werd er van verdacht uitgedroogd te zijn. Het vruchtlichaam was bleker en het slijmerige laagje op de hoed ontbrak. Op 9 september 2009, twee dagen later dan het jaar er voor, werd van dezelfde soort een nieuw vruchtlichaam gevonden in een ondiepe greppel tussen het wandelpad en de bosrand. Gerben Winkel, met wie ik die dag op de Lonnekerberg was, maakte er fraaie foto's van. De ridderzwam stond er dit keer in een periode waarin het veel regende. Op de hoed ontbrak alweer het slijmerige laagje en het voelde ook niet kleverig. De kleur was ook deze keer bleek, waardoor ik begon te twijfelen of de eerdere determinatie correct was.

Figuur 1. *Tricholoma psammopus* (Lariksridderzwam). (Foto: Gerben Winkel)





Figuur 2. *Tricholoma psammopus* (*Lariksridderzwam*). (Foto: Gerben Winkel)

Korte beschrijving

Hoeddoorsnede 60 mm, vlak gewelfd met een lage umbo, droog, met aangedrukte fijne schubjes, okerbruin op een wat lichtere ondergrond. Lamellen uitgebocht aangehecht, crème-kleurig met roestvlekken. Steel 60 x 14 mm, bochtig en naar de basis verbredend maar dan puntig eindigend, dicht bezet met okerkleurige fijne vlokjes op een lichte ondergrond, het bovenste deel scherp afgezet, de top bezet met wittige fijne vlokjes.

Sporen $5,8-7 \times 4,2-5 \mu\text{m}$, Q: 1,2-1,6, breed elliptisch, kleurloos, vaak met een grote interne druppel, soms met meerdere kleine. Sporee wit. Basidiën 4-sporig, geen gesp gezien, $28-35 \times 4-7 \mu\text{m}$. Cystiden afwezig. Hoedhuid een cutis met een overgang naar een trichoderm, hyfen voor een deel met bruin pigment. Caulocystiden aanwezig op de steel.

Een aantal weken later werd er op dezelfde groeiplaats nog een aantal vruchtlichamen gevonden. Het materiaal werd bekeken door Nico Dam (die zich naar eigen zeggen wel stevig achter de oren moest krabben) en Chiel Noordeloos en het bleek inderdaad om een andere ridderzwam te gaan, namelijk *Tricholoma psammopus*, Lariksridderzwam. Ook dit is een soort die slechts zelden wordt gemeld.

Met dank aan Gerben Winkel voor de foto's.

Literatuur

- Bas. C. et al. 1999. Flora Agaricina Neerlandica, deel 4. Balkema, Rotterdam.
Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1991. Pilze der Schweiz, Band 3. Verlag Mykologia. Luzern.
Jagers, M. 2009. Een Bergkwartet. Coolia 52 (1): 32-35.

