

Vondsten van zeldzame en bedreigde mossen 1

Abstract: Records of rare and threatened bryophytes 1.

Annual survey of verified records of rare or threatened bryophytes found in the Netherlands.

Dit is de eerste aflevering van een jaarlijks in Buxbaumiella te verschijnen rubriek met een overzicht van gecontroleerde vondsten van zeer zeldzame en sterk afgenomen blad- en levermossen. De betreffende soorten en hun reviseurs staan vermeld in Buxbaumiella 65 (Inventarisatiehandleiding, Tabel 2) en op www.blwg.nl. Voor opneming komen alle vindplaatsen in aanmerking die nog niet eerder zijn gereviseerd (bladmossen: Touw & Rubers; levermossen: Gradstein & Van Melick; veenmossen: Bouman). Gedocumenteerd herbariummateriaal kan hier toe voor controle worden opgestuurd naar de betreffende reviseur.

Antitrichia curtipendula (Weerhaakmos)

Gem. Vianen, polder Bolgarijen, knotwilg, ca. 50cm boven sloot, omringd door grienden, km-hok 135-441, 30-04-2002 (Dick Kerkhof); Geldrop, dal Kleine Dommel stam van wilg, km-hok 168-380, 14-12-2003 (Riek van den Bosch); Milschot, gemeente Gemert, stam ratel-populier op voormalige vuilstort, km-hok 177-393, 21-03-2004 (Jan Kersten); Gemert, dode larix-takken, km-hok 180-396, 24-05-2004 (Jan Kersten); Broekhuizerbroek, elzen/berkenbroekbos, km-hok 206-388, 4-04-1999 (Marleen Smulders)

Calliergon giganteum (Reuzenpuntmos)

Lochem, in ondiep onder water staand deel van Beekvliet, km-hok 229-459, 21-05-2002 (Kasper Reinink)

Encalypta vulgaris (Klein klokhoedje)

Duin- en Kruidberg, km-hok 24.28.15, 3-01-2001 (Niko Buiten); Duin- en Kruidberg, km-hok 24.18.55, 14-02-2002 (Niko Buiten)

Eucladium verticillatum (Tufmos)

Pietersberg, langs de Jeker, km-hok 175-315, 13-03-2004 (Riek van den Bosch)

Habrodon perpusillus (Duizendpootmos)

Ameland, Buurderduinen, op vlier in struweel, km-hok 183-608, 8-03-2000 (Rienk-Jan Bijlsma); Kraantje Lek, op populier in schorsspleet, groeiplaats enkele cm² groot, km-hok 25.31.21, 25-07-2003 (Niko Buiten). Op deze locatie is Duizenpootmos nieuw voor Nederland

ontdekt in 1947 op een oude kurkiep (Ned.Kruidk.Arch. 57:297), inmiddels op Grauwe abeel (Buxbaumiella 40:33) en populier.

Hedwigia ciliata (Recht granietmos)

Helmond, mestfabriek, asfalt, km-hok 176-384, 20-10-2002 (Jan Kersten); Zutphen, Hobbemakade, stam van Es, laanbeplanting, km-hok 211-462, 3-11-2003 (Kasper Reinink)

Hedwigia stellata (Stergranietmos)

Eindhoven, heempark, stam van wilg, km-hok 160-381, 14-01-1999 (Cor Broekman); Arnhem, Schelmseweg, asfaltgoot, km-hok 192-447, 30-12-1997 (Kasper Reinink; in Buxbaumiella 53:17/18 abusievelijk als *H. ciliata* opgegeven)

Hypnum lindbergii (Leemklauwtjesmos)

Hoog Soerense Bossen, langs en over stronk in oever van Ruitersgat, km-hok 188-472, 13-09-2003 (Rienk-Jan Bijlsma; in Buxbaumiella 4:22 is deze vindplaats foutief opgenomen als km-hok 188-471); Op half verhard pad langs de Epenerbaan in het Holsetterbos bij Vijlen, km-hok 196-308, 3-05-2003 (Henk Siebel); Millingerwaard bij Kekerd, op verschillende licht beslibde stenen bovenaan de steenglooiing langs de Waal bij het Colenbrandersbos, km-hok 197-432, 13-09-2003 en 3-04-2004 (Henk Siebel). Deze sterk achteruit gegane soort was vroeger vooral van leemkuilen bekend maar wordt ook op lemig-stenige bodem (of op beslibde stenen) gevonden. Goed zoeken op halfverharde bospaden met *Juncus tenuis*, waar deze soort in het buitenland (b.v. Ardennen) kenmerkend voor is, kan nieuwe vindplaatsen opleveren.

Hypnum imponens (Goudklauwtjesmos)

Ugchelse bos, op verterende liggende eikentak in bos, km-hok 188-463, 3-01-2003 (Rienk-Jan Bijlsma). Deze in vochtige heide sterk achteruitgegane soort heeft door de toename van dood hout nieuwe kansen gekregen.

Leptodon smithii (Slakkenhuismos)

Nuenen, Refelingse Heide, stam van wilg, km-hok 167-385, 29-05-2004 (Jan Kersten)

Leucodon sciuroides (Eekhoortjesmos)

Bergeyk, stam van vogelkers, km-hok 153-368, 4-06-2001 (Huub van Melick); Eindhoven, O. wijk Vaartbroek, stam van wilg, km-hok 163-388, 21-12-2003 (Marleen Smulders); Heeze, stam van populier, km-hok 167-379, 23-11-2003 (Riek van den Bosch)

Neckera pumila (Klein kringmos)

Geldrop, dal Kleine Dommel, tak van wilg, km-hok 168-380, 14-12-2003 (Cor Broekman); Vlierden, Gem. Deurne, stam zomereik, km-hok 181-383, 27-01-2004 (Jan Kersten)

Plagiomnium elatum (Geel boogsterrenmos)

Eindhoven, Bokt, elzen/essenbroekbos, km-hok 163-389, 17-04-2004 (Marleen Smulders); Eindhoven, Rietmussen, elzen/berkenbroekbos, km-hok 164-388, 22-03-2004 (Marleen Smulders)

Plagiomnium medium (Bergboogsterrenmos)

Strijbeeksche Heide, elzenbroekbos, km-hok 114-389, 3-12-2002 (Chris Buter). Tweede vondst in Nederland en rijkelijk kapselend!

Pleurochaete squarrosa (Hakig kronkelbladmos)

AW Duinen, km-hok 24.47.45, 5-11-2001 (Niko Buiten); Kraansvlak, km-hok 25.31.21, 23-12-2002 (Niko Buiten); Middenduin Overveen, km-hok 100-489, 06-08-2002 (Hans de Bruijn)

Polytrichum alpinum (Berghaarmos)

Hoogeloon, droge greppel, km-hok 148-378, 26-04-1997 (Cor Broekman; herb. H.van Melick)

Rhynchostegium rotundifolium (Rondbladig snavelmos)

Rotterdam-Bospolder, op beton ter versteviging van grasdijkje in afbraakwijk tussen slooppanden, km-hok 89-435, 10-07-2003 (Hans de Bruijn). Deze soort heeft een duidelijke voorkeur voor verwaarloosde door de mens gemaakte bouwwerken en zou ook in andere steden gevonden kunnen worden.

Rhytidium rugosum (Buizerdmos)

In duinen bij Noordwijk, km-hok 94-481, 2003 (Niko Buiten). Deze soort is in het centrum van het renodunaal district niet zeldzaam.