

Vervolgverhaal roodmus *Carpodacus erythrinus*

C.M. Liebrechts-Haaker

Al eerder heb ik iets verteld over de aanwezigheid van de roodmus in ons vangterrein (zie OHV 66:11-13, maart 1992).

Hoe is het 'onze' roodmus(sen) verder vergaan?

De eerste exemplaren van de roodmus hebben wij op 10 juli 1987 geringd: een ♀ na 1 kj met grote rode bloedvlek en enige tijd later nog drie juveniele exemplaren. Het overzicht geeft aan dat de roodmussen ieder volgend jaar tot en met 1997, trouw aanwezig zijn geweest. In totaal werden er in de aangegeven periode 48 exemplaren nieuw geringd en 27 eerder geringde vogels teruggevangen. Wij hebben nooit een extra mistnet in de directe omgeving van het nest geplaatst en we zijn steeds uiterst voorzichtig met de broedgevallen. Mijn motto blijft: "Liever niet vangen dan verstoren."

1988 De roodmussen waren aanwezig, broedresultaat onbekend.

1990 Nest juist buiten het vangterrein; de >2kj ♂ liet zich steeds zien. De vogels fourageerden aan de dijk en op de aan de kwelsloot grenzende akker.

1996 Nest verstoord.

1997 Ondanks alle werkzaamheden in de omgeving van ons vangterrein heeft hier een paartje haar jongen grootgebracht.

Een opmerkelijke terugvangst leverde de roodmus met ringnummer B 846.505 op. Deze vogel, een ♂ werd op 22 juni 1992 geringd als ♂ > 2^e kj met een vleugellengte van 88 mm en een gewicht van 23 g. Op 9 juni 1993 werd deze vogel teruggevangen. De vleugellengte én het gewicht bleken gelijk te zijn aan het jaar daarvoor. Op 20 juni 1994 troffen we deze roodmus weer aan. De vleugellengte en het gewicht van de vogel waren als vanouds 88 mm en 23 gram! De vogel werd gevangen om resp. 6.45u, 6.15u, en 11.00u. Het betreft dus steeds ochtendgewichten, maar bij de laatste vangst had de vogel meer fourageertijd achter zich dan bij de eerdere vangsten.


Op 19 mei 1997 presteerde iemand het om het bij een roodmus horende ringnummer B 804.400 met de telescoop af te lezen (een 2.8 mm ring!, red). Deze roodmus werd door mij op 17 juni 1991 als een 2^e kj ♂ geringd (om 12.00u, gewicht 22,5 g). De vogel bleek de respectabele leeftijd van 7 jaar te hebben.

Waar onze roodmussen overwinteren is mij tot op heden nog niet bekend

De roodmus is een alerte en schuwe vogel; aan het nest komen is funest.

Zijn voorkeur gaat uit naar een landschap met verspreid liggende bosjes, waar hij

roodmusvangsten Z-Flevoland



tevens graag kruidige akkers tot zijn beschikking heeft. Roodmussen zijn bijvoorbeeld dol op koolzaad. Zoals van veel zaadeters bekend is eten ze veel bloem- en bladknoppen. De wilde rozen aan de voet van de dijk hebben eveneens hun grote belangstelling. In Nederland is de roodmus waarschijnlijk sinds 1987 een zeldzame broedvogel.

Noot redactie: Uit het SOVON-project voor Zeldzame en Schaarse Broedvogels blijkt 1992 tot nu toe een piekjaar (54 geteld). De soort broedt met name op de Waddeneilanden, in de Hollandse duinen en Zuid-Flevoland. Daarnaast is hij aangetroffen in het rivierengebied (Waal, Maas), de Zeeuws-Brabantse delta, NO-Groningen en Zuid Friesland. In West Vlaanderen en NW-Frankrijk komt de uit het oosten oprukkende roodmus ook tot broeden. (Bron: SOVON-broedvogelverslagen 1992-1995, Hustings, Van Dijk, Meijer, Sierdsema & Verstrael, SOVON Beek-Ubbergen).

adres: C. M. Liebregts-Haaker, Kerklaan 73, 1241 CL KORTENHOEF