

CES 2008 op het Vogeltrekstation

Gijs van Tol en Gerrit Speek

Met een team van tien personen (ringers en helpers) hebben we in 2008 het derde CES jaar gedraaid. We hebben 130 meter mistnet staan, waarvan 2 hijsnetten (zie OHV nr. 111). Na een enthousiaste start in 2006 (zie OHV nr. 109) en een zeer succesvolle CES in 2007 waren de verwachtingen voor het seizoen 2008 hooggespannen. Nu, aan het eind van het seizoen, weten we weer dat de bomen niet tot in de hemel groeien (al zou je dat aan de hazelaar opslag niet zeggen...). Het weer tijdens de vangdagen was over het algemeen goed. Wel was het voorjaar minstens 14 dagen later dan in het voorgaande jaar. In 2007 noteerden we volop bloeiende sleedoorns al bij de eerste CES dag op 15 april, dit jaar was dat duidelijk later.

Voor het eerst hebben we ook een CES dag moeten missen; door een mismatch tussen beschikbaarheid en weersgesteldheid viel CES 10 helaas uit.


Zoals blijkt uit tabel 1 vielen de vangsten echter over de gehele linie tegen.

Tabel 1. CES vangsten en terugvangsten per jaar 2006 - 2008

jaar	vangsten	terugvangsten	Totaal
2006*	264	114	378
2007	336	189	525
2008	223	107	330

* eerste jaar, nog geen hijsnetten.

Het verloop van de vangsten gedurende het seizoen vertoont elk jaar ongeveer het zelfde beeld. Het seizoen start met redelijke aantallen, maar aan het eind van het seizoen vangen we niet meer dan 20 tot 25 vogels per dag. Het lijkt er dus op dat de vogels in de loop van het seizoen met jongen en al andere terreinen opzoeken.



Grafiek 1. De CES vangsten per CES-dag (vangsten + terugvangsten).

De top tien van de nieuw gevangen vogels wisselt flink van jaar tot jaar. Tijftjaf en Zwartkop zijn door de jaren heen de meest gevangen soorten. Verder zijn Huismus, Ringmus, Winterkoning en Heggemus steeds goed vertegenwoordigd. De huismussen worden vrijwel uitsluitend in de maand mei gevangen; vermoedelijk verzamelen ze dan in de singels insecten voor de nestjongen. Na eind mei verblijven de ouders met uitgevlogen jongen elders op het terrein.

Tabel 2. “Top tien” in aantallen van de nieuw geringde vogels in 2006 – 2008. Aantallen, tussen haakjes de rangorde.

Soort	2008	2007	2006	
Tjfitjaf	26 (3)	46 (1)	36 (1)	Phylloscopus collybita
Zwartkop	27 (2)	29 (4)	29 (3)	Sylvia atricapilla
Koolmees	32 (1)	20 (9)	27 (4)	Parus major
Merel	10 (9)	26 (5)	32 (2)	Turdus merula
Ringmus	17 (6)	41 (2)	14 (8)	Passer montanus
Huismus	12 (7)	30 (3)	16 (6)	Passer domesticus
Winterkoning	20 (5)	23 (7)	18 (5)	Troglodytes troglodytes
Heggemus	24 (4)	21 (8)	15 (7)	Prunella modularis
Roodborst	11 (8)	12 (10)		Erithacus rebecula
Fitis	7 (10)			Phylloscopus trochilus
Kl. Karekiet			13 (10)	Acrocephalus scirpaceus
Pimpelmees			14 (9)	Parus caeruleus
Staartmees		24 (6)		Aegithalos caudatus

Bijzondere vangsten kennen we op deze CES plek nauwelijks. De lijst van ‘leuke soorten’ werd dit jaar aangevoerd door een fraaie man Gekraagde Roodstaart. De prijs voor de meest boeiende levensgeschiedenis gaat naar een Braamsluiper, die in september 2006 als 1^e kj in Belgisch Brabant werd geringd. In 2007 vingen we deze vogel slechts één maal, in juli. De vriendelijke behandeling in 2007 is hem kennelijk goed bevallen, want dit jaar controleerden we hem diverse malen en we nemen aan dat hij ter plaatse heeft gebroed.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het aantal gevangen vogels aan het eind van de CES periode wel wat teleurstellend is en daardoor niet erg motivatie bevorderend. Maar wie A zegt moet CES minstens vijf jaar volhouden. Bovendien gaat het instituut eind 2010 zeer waarschijnlijk verhuizen naar Wageningen, dan moeten we onze vangplek toch verlaten. De komende twee jaar houden we dus zeker nog vol.

Gijs van Tol, Gerrit Speek