


## Tweede en derde waarneming van Bonte Tapuit *Oenanthe pleschanka* in Nederland

Op 24 oktober 1992 ontdekten Ruud Brouwer en Hans Endt op een terreintje van Rijkswaterstaat bij Petten, gemeente Zijpe een mannetje van de Bonte Tapuit in het eerste winterkleed. De vogel had, zoals op bijgaande foto's redelijk goed is te zien, een donkere kruin, rug, keel en borst en lichte onderdelen. Een lichte streep boven het oog en de lichte randjes aan de veren van de vleugels zijn ook goed te zien.

Tot en met 26 oktober is de vogel door vele waarnemers waargenomen. En alsof dat nog niet genoeg was, ontdekte René van Rossum op 31 oktober 1992 een vrouwtje van deze soort in eerste winterkleed bij de Noordpunt van de Noorderboulevard te Katwijk aan Zee. Deze vogel is tot en met 4 november 1992 waargenomen:



Bonte Tapuit, mannetje, Petten, gemeente Zijpe, 26 oktober 1992.  
Foto: Jaap van 't Hof.



Vrouwtjes Bonte Tapuit, Noorderboulevard, Katwijk aan Zee, 1 november 1992.  
Foto: Marten van Dijk.



Mannetjes Bonte Tapuit, eerste winterkleed, Petten, gemeente Zijpe, 26 oktober 1992.  
Foto: Jan van Houten.

De bovenstaande waarnemingen betreffen de tweede en derde waarneming van de Bonte Tapuit in Nederland. De eerste waarneming werd gedaan op 28 mei 1988 op Schiermonnikoog, ook dát betrof een vrouwtje.

Het broedgebied van de Bonte Tapuit strekt zich uit van de Zwarte-Zeekust van Bulgarije tot voorbij het Baikalmeer in de voormalige Sovjet-Unie. De Bonte Tapuit wordt beschouwd als de oostelijke oecologische vervanger van de Blonde Tapuit (Voous).

De soort overwintert in de grasrijke en steenachtige steppen en hoogvlakten van Noordoost-Afrika en Zuidwest-Arabië.

Uit Noordwest-Europa zijn enkele tientallen waarnemingen van de Bonte Tapuit bekend.

H.J. Lichtenbeld.



Vrouwtjes Bonte Tapuit, eerste winterkleed, Katwijk aan Zee, 1 november 1992.  
Foto: Jaap van 't Hof.