

# Mededelingen

## **Konijnen en Viraal Hemorrhagisch Syndroom**

Zoals iedereen ondertussen wel weet is de stand van het konijn het laatste decennium ingestort. Uit verschillende delen van het land horen we overigens verhalen dat er sprake is van herstel, maar niettemin is de huidige situatie nog steeds slechts een schim van wat het was. Afgelopen jaar, 2005, hebben leden van de WRN verspreid over het land resten van konijnen verzameld bij nesten van kiekendieven, Havik en Buizerd. Deze resten zijn onderzocht door Thijs Kuiken en Marco van de Bildt van de afdeling Virologie van het Erasmus MC Rotterdam. In totaal zijn er van 72 konijnen bruikbare resten ingezameld, van de Waddeneilanden tot Limburg. Uit botresten is beenmerg geprepareerd en RNA geïsoleerd. In dit RNA is door middel van een PCR techniek specifiek gezocht naar genetisch materiaal van RVHD (het VHS virus). In drie van de monsters is inderdaad RVHD aangetroffen, namelijk in twee monsters van juni 2005 van Terschelling (1x prooi Bruine Kiekendief, 1x dito Blauwe Kiekendief), en in een monster uit 2003 uit de omgeving van Groesbeek. Van dit RNA uit de konijnenbotjes is de nucleotide sequentie bepaald om de isolaten met elkaar en met een eerder door Erasmus MC geïsoleerd virus te kunnen vergelijken. De andere monsters waren negatief voor RVHD.

*Contact: M.W.G. van de Bildt, Afdeling Virologie, Erasmus MC Rotterdam, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam (m.vandebildt@erasmusmc.nl).*

## **Eerste broedpoging van Zeearend *Haliaeetus albicilla* in Nederland**

In een persbericht van Staatsbosbeheer van 22 mei 2006 wordt melding gemaakt van een broedgeval van een paartje Zeearend in de Oostvaardersplassen. Hoewel SBB suggereert dat om hetzelfde adulte mannetje en bijna-volwassen vrouwtje (Anna, uit Sleeswijk-Holstein) gaat als overzomerend vastgesteld in 2005 (zie De Takkeling 13: 172-173) is dat nog niet met zekerheid vastgesteld. Wel zeker is dat het paar zelf een nest heeft gebouwd in het moerasgedeelte van de OVP, dat daar vanaf eind maart op gebroed is en dat het gedrag vanaf mei duidt op de aanwezigheid van één of meer jongen. Of er eieren B meervoud B zijn uitgebroed, zoals gemeld in het persbericht, is evenmin zeker; er is namelijk afgezien van nestcontroles. Mocht dit inderdaad het paar zijn dat in 2005 overzomerde, is het aannemelijker dat het wijfje maar één ei heeft gelegd (immers haar eerste broedpoging). Ook de suggestie van Frans Vera dat de vestiging te maken heeft met de aanwezigheid van kadavers van edelherten in de winter, is niet onderbouwd. Voor zover ik weet heeft niemand systematisch gekeken naar terreingebruik en voedselkeus van de Zeearenden in de OVP. Totdat deze studie heeft plaatsgevonden is zo'n uitspraak wat voorbarig. En nu maar afwachten of deze broedpoging met succes wordt bekroond. En hopen dat het jong wordt (gekleur)ringd, omdat we anders bij gebrek aan basale kennis over vestiging, dispersie en overleving opnieuw met een vloed van speculaties worden overstroomd.

*Contact: Staatsbosbeheer (Joke Bijl), 030-6926210 of 06-12507820.*