

Gekleurmerkte vogels in de Ruidhorn Groningen 1999 - 2003



De Ruidhorn is een natuurontwikkelingsproject in de Emmapolder, gemeente Eemsmond. Zes jaar geleden werd hier begonnen met veertiendaagse tellingen van watervogels (SOVON-watervogelproject). Een beschrijving van het gebied is te vinden in een eerdere *Grauwe Gors* (Boekema & Veenendaal 2000).

Vanaf 1999 is tijdens deze tellingen bijna iedere keer gezocht naar gekleurmerkte vogels. Dit leverde 160 waarnemingen op van 89 verschillende gekleurmerkte individuen, verdeeld over 10 soorten.

Soorten en herkomst

Aalscholver *Phalacrocorax carbo*

Er is in de nazomer van 2001 een gekleurringde Aalscholver gezien die datzelfde seizoen als nestjong was geringd in de Oostvaardersplassen.

Lepelaar *Platalea leucorodia*

Lepelaarkleurringen zijn pas de laatste twee jaar (2002-2003) afgelezen, van april tot september. Twee vogels waren geringd op Terschelling, één op Vlieland, elf op Schiermonnikoog en één in Onderdijk (Noord-Holland). Verder werd er dit jaar een gekleur-

ringde Lepelaar gezien die in juni was geringd als nestjong bij Limfjord, Jutland, Denemarken.

Grauwe Gans *Anser anser*

Ook gekleurmerkte Grauwe Ganzen worden pas sinds 2002 in de Ruidhorn waargenomen (in september en oktober). Het gaat hierbij om tien ganzen met een blauwe halsband, waarvan er één zowel in 2002 als in 2003 in de Ruidhorn is waargenomen. Al deze ganzen komen uit Noorwegen.

Brandgans *Branta leucopsis*

Alleen in 1999 en in 2002 zijn er gekleurringde



Brandganzen in de Ruidhorn gezien. Er zijn twaalf verschillende pootringcombinaties afgelezen, alle geringd in Zweden (elf op Gotland, één op Öland).

Smient *Mareca penelope*

In juni van dit jaar is er een Smient gezien met een gigantisch geel vleugelmerk. De vogel had deze mishandeling ondergaan in Engeland.

Scholekster *Haematopus ostralegus*

Er zijn 33 gekleurde Scholeksters afgelezen. Deze waren bijna allemaal rondom de Waddenzee geringd: Texel, Ameland, Schiermonnikoog, Balgzand, Sexbierum, Wierum, Emmapolder, Eemshaven en Delfzijl. Een bijzondere waarneming was de Scholekster die op 12 juni 2002 als nestjong was gekleurd op Devichauda Luda Eiland in de Witte Zee, Rusland. Deze vogel is vier keer in de Ruidhorn waargenomen (maart, mei en juni 2002, mei 2003).

Kluut *Recurvirostra avosetta*

In juni 2002 werd er een Kluut gezien die in Spanje van een gele ring was voorzien.

Kokmeeuw *Larus ridibundus*

Alle twaalf waarnemingen hadden betrekking op Kokmeeuwen die op de Linthorst-

Homanpolderkwelder van een groen vleugelmerk waren voorzien.

Stormmeeuw *Larus canus*

Op 6 november 2002 werd een gekleurde Stormmeeuw gezien, geringd op 5 juni 1996 op een eiland in de Wisla, bij Tyrzyn, Polen.

Zilvermeeuw *Larus argentatus*

Van de vijf verschillende gekleurde Zilvermeeuwen waren er twee op Schiermonnikoog geringd, twee op Helgoland, Duitsland en één op Katholm, Nordborg, Jylland, Denemarken.

Over vrijwel alle kleuringprogramma's is informatie te vinden op www.cr-birding.be. Hierop zijn ook de (e-mail)adressen waar waarnemingen naar toe kunnen worden gestuurd te vinden. Vaak krijgt men dan per ommekeer de life-list van de betreffende vogel.

In De Grauwe Gors wordt door Klaas van Dijk regelmatig gepubliceerd over geringde vogels in Groningen. Dit artikel laat zien dat zelfs vanaf één punt een leuke lijst van waarnemingen kan ontstaan.

Literatuur

Boekema, E.J. & D.Veenendaal 2000, 'De Ruidhorn' in *De Grauwe Gors* 28: 57-62.

