

verwinterende Buizerd in het recreatiegebied Karding (2)

Wouter Peters

Naar het zich laat aanzien is de 'Ruigpootbuizerd van Noorddijk' inderdaad met zekerheid een andere vogel dan de Buizerd *Buteo buteo* die ik in mijn artikel in *Gors* 2003-4 heb beschreven. Mogelijk is het zelfs dezelfde Ruigpootbuizerd *Buteo lagopus* die ik in oktober 2003 vanaf het brede, geasfalteerde fietspad langs de sportvelden in glijvlucht cirkelend in noordelijke richting over het gebied Karding heb zien trekken. De coïncidentie van de eerste melding van 'Ruigpoot' in 'Noorddijk' (7-44) van deze winter op de website en mijn waarneming van de opmerkelijke Buizerd in een boompje op het terrein van de kanoverhuur in het gebied Karding een dag later deed mij concluderen dat het om dezelfde vogel ging. Foutief naar nu blijkt. Ik had er beter aan gedaan dit eerst te controleren. Tot mijn verdediging zou ik kunnen aanvoeren dat strikt genomen de Ruigpoot zich doorgaans niet in Karding vertoont en dat je het gebied waar het beest zich wel ophoudt eigenlijk niet goed meer tot Noorddijk kunt rekenen. 'Tussen Thesinge en Zuidwolde' geeft de plek beter aan.

Mijn Buizerd hield zich doorgaans op in het oostelijke deel van het Beijumer Bos, de bosaanplant ten noorden van de molen en ten oosten van de Noorddijkerweg. Incidenteel zag ik het beest ook wel eens op paaltjes zitten net buiten het gebied in de weilanden of op de akkers, zowel ten zuiden, ten oosten als ten noorden van het bos maar verder dan een paar honderd meter waagde hij/zij zich niet buiten het 'bos'. Inderdaad verleden tijd, helaas. Begin november zag ik de vogel deze winter weer voor het eerst. Regelmatig heb ik het dier tot in de eerste helft van januari en rond het Beijumerbos waargenomen maar

daarna niet meer.

De Ruigpootbuizerd van Thesinge is overduidelijk een andere vogel. Alleen al de opmerkelijk lichte vlekken op de mantel maken dit duidelijk. Die vlekken vertoont de in mijn artikel beschreven vogel niet. Na het verschijnen van de laatste *Gors* werd het mij duidelijk dat ik die Ruigpootbuizerd veel noordelijker moest zoeken dan waar ik naar hem uitkeek. Daarna heb ik inderdaad daar enkele malen Ruigpootbuizerd heel fraai kunnen waarnemen. Toch moet mij van het hart dat, hoewel het duidelijk om een Ruigpootbuizerd gaat, het gedrag niet karakteristiek is. Het biotoop is niet à la Ruigpoot, veel te gecultiveerd, en het jachtgedrag van dit individu ook niet. Maar hij wordt als een opportunistisch jager beschreven en kennelijk heeft deze vogel de voordelen van paaltjes weten te leren waarderen.

Ook dat is niet nieuw. Ik heb me ooit verbaasd over een Torenvalk *Falco tinnunculus* die ik in het toen nog communistische Mozambique op het terrein van een radiozenderpark bij Maputo herhaaldelijk heb zien jagen, en wel uitsluitend vanaf de toppen van de zendmasten. Van daaraf liet hij zich stevast op zijn prooi vallen. In de vier jaar dat ik daar zijn buurman was heb ik het beest geen enkele keer zien bidden!

Het laat overigens de reden dat ik het artikel voor de *Gors* schreef onverlet. Maar al te vaak en te gemakkelijk worden afwijkend getekende Buizerden voor onder meer Ruigpoot gehouden.

