

Geslaagde broedpoging van Kluten *Recurvirostra avosetta* op de vloeivelden van Nieuw-Buinen

Jannes Santing

Nadat Kluten *Recurvirostra avosetta* in 1992 en 1993 mislukte pogingen tot broeden hadden ondernomen op de vloeivelden van Nieuw-Buinen (Santing 1994), was het in 1996 raak.

Op 16 mei werden tijdens de jaarlijkse telling van Kokmeeuwen *Larus ridibundus* en Visdiefjes *Sterna hirundo* 12-13 Kluten aangetroffen in het zuidoostelijke deel van de vloeivelden. Dit betrof hetzelfde compartiment als in 1993. Er werden zes nesten gevonden met resp. 1x twee, 2x drie en 3x vier eieren per nest. In tegenstelling tot 1993, toen de nesten in vrij hoog gras lagen en daardoor werden verkoepeld, lagen de nesten nu op nagenoeg kale grond. De nestplaats betreft een binnendijk die aan beide kanten door water is omgeven. Het 4 m brede dijklichaam was kort tevoren gerestaureerd, vandaar de kale grond. De afstand van de nesten tot het water bedroeg ongeveer 1.5 m. De nesten lagen 30-40 cm boven het waterpeil. De nesten lagen verspreid op de dijk over een strook van c. 50 m. Hier werden tevens meerdere nesten van Kokmeeuwen gevonden.

Op 2 juni werden nog slechts twee Kluten aangetroffen en een nest met twee eieren. Van de inhoud van de andere nesten werd niets teruggevonden. Tijdens een kort bezoek op 9 juli was er een adulte Kluut die luid alarmeerde, tezamen met één bijna vliegvlug jong. Op 11 augustus werden een adulte, alarmerende Kluut en twee vliegvlugge jongen gezien.

De oorzaak van het mislukken van de overige vijf nesten is niet bekend. Het betreffende stuk dijk is vanuit twee richtingen goed toegankelijk voor mensen en predatoren. Aan één kant van de dijk liep een lage afrastering van schapengaas, precies bij het geslaagde nest (toeval?). Zelf heb ik geen predatie door Kokmeeuwen op nesten van Kluten gezien, maar ze zijn daar zeker toe in staat (Glutz von Blotzheim *et al.* 1977). Een tweede binnendijk, die wel geheel door water wordt omgeven, zou een stuk veiliger zijn geweest. Maar dat vonden de Kokmeeuwen ook; hier werden maar liefst 1684 nesten geteld, vermoedelijk de reden dat de Kluten geen plek konden vinden op de veilige plek.

Summary: Successful breeding attempt of Avocets *Recurvirostra avosetta* on a sewage farm at Nieuw-Buinen

After Avocets attempted to breed at Nieuw-Buinen (52°57'N, 6°55'E) in 1992 and 1993 (both times not successful), another attempt was made in 1996 with six pairs laying eggs (1x 2, 2x 3 and 3x 4 eggs, not necessarily completed clutches). A single pair raised two young. Five other nests failed during the egg stage, but the reason remained unknown. This site is the only one in Drenthe where Avocets breed.

Literatuur

- Glutz von Blotzheim U.N., Bauer K.M. & Bezzel E. 1977. Handbuch der Vögel Mitteleuropas, 7. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.
- Santing J. 1994. Broedpogingen van Kluten *Recurvirostra avosetta* op de vloeivelden van Nieuw-Buinen. Drentse Vogels 7: 14-15.

Adres: De Gloep 2, 7875 AJ Exloo.



Foto. Broedplaats Kluten, Vloeivelden Eerste Exloërmond, 20 mei 1993 (Jannes Santing).



Foto. Nest Kluut, Eerste Exloërmond, 20 mei 1993 (Jannes Santing).