

Zeetrekters, die in de gelegenheid zijn om in de genoemde weken te tellen vanaf de zuidpier van IJmuiden, worden verzocht om contact op te nemen met de voorzitter, zodat we één en ander kunnen coördineren.

MFL

MEDEDELINGEN

Congressen

Voor de liefhebbers: in *Bremen* wordt op 25 november 1999 een Duitstalige conferentie gehouden over: *Umweltfolgen der Seeschifffahrt*, met als thema de vraag of de Noordzee een bijzonder kwetsbaar gebied is. Aan de orde komen de gevolgen van anti-fouling verven op schepen (organotin), de introductie van vreemde planten- en diersoorten via de scheepvaart, en het voorzorgsprincipe waar het gaat om de regulering van de scheepvaart. Inlichtingen: Andrea Zebrowski, Werderstraße 73, D-28199 Bremen

Bijzondere waarnemingen en vondsten: geringde zeevogels

Wij willen alle leden uitnodigen om bijzondere ringvondsten of ringwaarnemingen van zee- en kustvogels door te geven. De redactie heeft contact gezocht met het Vogeltrekstation (*Postbus 40, 6666 ZG Heteren voor al uw terugmeldingen!*) om ons regelmatig te voorzien van dergelijke meldingen, maar leden kunnen ook direct hun vondsten aan ons doorgeven. Nog leuker zou het zijn, om ook de vogel zelf te verzamelen voor onderzoek. Door een vogel ook eens van binnen te (laten) bekijken, kan het geslacht worden achterhaald, soms de doodsoorzaak als dit niet aan de buitenkant duidelijk zichtbaar is (olie!) en soms ook nog wat de vogel voor het laatst gegeten heeft. Als voorbeeld: op 26 februari vond Leo Cleiren uit Houten op 'het strand Westenschouwen' een gekleurringde Zeekoet *Uria aalge*. Van de vogel weten we op dit moment niet méér dan dat hij/zij voorzien was van een Britse ring en dat er geen olie op de veren zat. Ter vergelijking: op 7 februari werd op Texel ook een geringde Zeekoet gevonden, die werd verzameld en vervolgens van binnen en van buiten onderzocht. Een combinatie van in- en uitwendige kenmerken wees erop, dat het ging om een tweede winter vogel (vrouwje), een leeftijd die bij navraag door de ringer werd bevestigd. Haar galgenmaal had bestaan uit drie zandspieringen en een kabeljauwachtige, zo bleek uit visresten die nog in de maag aanwezig waren. De doodsoorzaak was primair olie, gevolgd (?) door een slechte lichamelijke conditie: alle vet was verbrand, de vliegspieren ingevallen en de vogel had een inwendige schimmelinfectie. Er was nóg een leuke Zeekoet-terugmelding: eveneens op Texel werd een nog levende Zeekoet gevonden, die later aan zijn oliebevuilding doodging. Deze vogel was 7 jaar eerder ook al eens met olie in aanraking geweest, maar gewassen, gerecupereerd en uitgezet door vogelasiel Ureterp. Weer een bewezen geval dus, van een succes van de olievogel-opvang! Tenslotte werd, ook op Texel, op 21 februari een gekleurringde Noordse Stormvogel (een subadult vrouwje, dubbel licht, met Britse ringen) gevonden, betrokken bij één van de massastrandingsen deze winter (zie elders in deze nieuwsbrief).

MFL. Bronnen: Vogeltrekstation Heteren; EcoMare, Texel; eigen vondsten MFL, Sophie Brasseur en JAF.