

SOVON BSP-project hieraan nu eenmaal geen aandacht schenkt, is het gebrek aan informatie over bijvoorbeeld de leeftijd van de waargenomen vogels. Vogels zijn getallen geworden, wellicht omdat het toevoegen van meer specifieke informatie in grote databestanden als te veel rompslomp wordt gezien. Toch devalueren de besprekingen van (pakweg) kuifaalscholver en zeearend enorm, wanneer de lezer zelfs geen inzicht wordt verschaft in de leeftijd ervan. Hoe verhoudt de verspreiding van die kuifaalscholver zich tot de veel algemenere aalscholver? Het is een type vraag waar de auteurs niet aan toe zijn gekomen en dat is jammer. Wat resteert is een prachtig boekje, een waardevolle set gegevens, maar een incomplete uitwerking, waardoor de gegevens niet tot hun recht komen. Schaarse vogels zijn hartstikke leuk om te zien, in dit boekje kun je vinden hoe (on-) gewoon je waarneming in Friesland is, maar het biedt geen houvast of een context waardoor we meer over deze vogels leren.

CJC

Nieuwe Noordzee Nieuwsbrief: digitaal over de duinen, de kust en de zee: nieuwsbrief@kustenzee.nl

Aanmelding: Nieuwe abonnees zijn van harte welkom! E-mail naar nieuwsbrief@kustenzee.nl en vermeld 'aanmelding' bij het onderwerp. Redactie: John van Vliet (Stichting Duinbehoud), Arnoud van der Meulen, Albert Salman, Hanneke Mesters (Kustvereniging EUCC). De redactie van KustMail behoudt zich het recht voor, om berichten te selecteren en te bewerken. Inleveren inhoud voor Kustmail nr. 6: voor 15 november 2002.

GERINGDE ZEEVOGELS

Zeekoet T21827. Geringd als volgroeide vogel Canna, Schotland, op 30 juni 1985. Dood gevonden (met gebroken vleugel, zonder olie) op 12 februari 2002 op het strand van Ouddorp (ZH) door Dook Vlugt. De vogel werd minimaal 17 ½ jaar oud.

Kleine mantelmeeuw (Cempa) M10216. Geringd 25 januari 1992 te Chinicato, Faro, Portugal; afgelezen 5 november 1999 te Westkapelle door Pim Wolf.

Grote jager SW7 HT85982. Uw redacteur was 'life' getuige van de vondst/vangst van een levende, geringde grote jager op het strand van Terschelling door Hessel Wiegman. Hessel was 's nachts per jeep uitgerukt om zo veel mogelijk zee-eenden-met-olie te vangen en wij wilden wel eens weten hoe erg het daar was. Ons telefoongesprek werd ruw onderbroken door: 'wat is dat? Jager! Met een ring!' Het ringnummer werd meteen voorgelezen en doorgegeven aan Bob Furness, dé ringer van deze soort. Per kerende e-mail kwam de uitslag: geringd als pul op Foula, op 8 juli 2000. Furness verbaast zich over het zó noordelijk overwinteren van een nog zo jonge vogel; een geval apart dus. De vogel is overgebracht naar de Fugelpits in Anjum.

Zwarte zee-eend LONDON GF69040. Geringde zee-eenden zijn zeer zeldzaam. Met dank aan alle olielozers: een levend exemplaar werd op Ecomare-Texel binnengebracht. Herkomst wordt nog uitgezocht.

De eerste grote golf Tricolor-olievogels die in Zeeland aanspoelde bestond in meerderheid uit zeekoeten. Merkwaardig genoeg zaten daar slechts twee geringde tussen, een met een **Britse ring** (gevonden te Domburg, 31 januari, later uit een grote hoop gevestigd door Pim Wolf) en één met een **Franse ring** (Schouwen, 30 januari, Simon Hart). In de nasleep (?) van de Tricolor-olieramp werden meer **Britse ringen** gevonden. Simon Hart vond op 4 februari op Schouwen een juveniele alk met een Britse ring; een dag later vond Simon Hart samen met Jan de Korte een juveniele zeekoet met een Britse ring (**M96372**) bij Renesse; op 6 en op 7 februari 2003 vonden Jaap van der Hiele en Sander Lilipaly op Noord-Walcheren ieder een **zeekoet** met een Britse ring (**T54641** en **GJ 07109**). Op 7 februari werd nog een derde BTO-**zeekoet** gevonden, die levend naar de opvang van de Mikke werd gebracht (**X36487**); op 9 februari vond Thea Haak bij het zuiderhoofd van Westkapelle een Britse zeekoet (**X85366**) en de voorlopig laatste in GB geringde vogel werd –alweer– gevonden door Simon Hart, tussen de Brouwersdam en de vuurtoren van Haamstede: een alk (**M91965**). Bij de eerste grote golf vogels leken er dus relatief weinig geringde slachtoffers te zijn gevonden. Later werden er vooral vogels met Britse ringen gevonden. De eerste golf olievogels was vermoedelijk uit Belgische wateren afkomstig, vogels die later in de olie terecht kwamen en in Zeeland strandden kwamen waarschijnlijk meer uit de Nederlandse Voordelta. Kan het zo zijn dat in Belgische wateren zeekoeten overwinteren met een andere herkomst (meer uit Frankrijk?) dan in de wateren voor de Nederlandse kust?