

één van de zeehonden-tellers aan boord van het vliegtuig). Bij een inventarisatie te voet, later in de maand in het gebied werden vele ruiveren gevonden. In het gebied werd een flinke, maar geen uitzonderlijke hoeveelheid kokkelbroed vastgesteld. Op de foto is een deel van een van de groepen te zien, die zat te rusten op een zandbank aan (veilig) dieper water. Ook enkele gewone zeehonden lagen hier te rusten; merk op dat de bergeenden gepaste afstand bewaren tot deze dieren.

MFL

Referentie:

Smit J. 2001. Nieuwe ruiplaats van Bergeenden in de Waddenzee. Nieuwsbrief NZG 3(2): 2-3.

Naschrift: ook in de Westerschelde overzomeren tegenwoordig flinke aantallen Bergeenden, zo staat te lezen in een recent rapport van Berrevoets *et al.* (2003). Van juni tot augustus verblijven hier 4000-9000 exemplaren, waarvan men aanneemt dat ze ruien in het gebied. Sinds begin jaren negentig neemt het belang van de Westerschelde voor bergeenden toe; in augustus 2001 werd het voorlopige maximum van 10 725 “ruiers” geteld.

Zie: Berrevoets C.M., Strucker R.C.W., Arts F.A. & Meininger P.L. 2003. Watervogels in de zoute Delta 2001/2002 Rapport RIKZ/2003.001, 88p. Gratis te downloaden van: <http://www.rikz.nl/thema/ikc/rapport2003/rikz2003001.pdf>

Witte/rouwkwikstaart: nieuwe broedvogel op de Nederlandse Noordzee

Op het grote offshore platform dat net (op 2,7 km) ten noorden van oostelijk Ameland in de Noordzee staat, is een nest met eieren van een witte kwikstaart of van een rouwkwikstaart gevonden tijdens schilderwerkzaamheden. Men heeft het nest zo veel mogelijk ontzien, maar het vervolg van het broedsel niet gevolgd, waardoor het onbekend gebleven is hoe de vogels het ervan afgebracht hebben. Het nestmateriaal bestond uit vooral touw en plastic dat wellicht van de poten van het platform werd geplukt tijdens laagwater. Het voedsel kan eigenlijk alleen bestaan hebben uit insecten (die vaak volop aanwezig zijn, ondermeer tussen de aangroei op de poten en in allerlei hoekjes en gaatjes op het platform zelf, waar insecten vaak worden ingevangen in de luwte. Ik kan me niet voorstellen dat de vogels heen en weer hebben gevlogen tussen Ameland en het offshore platform om voedsel van land te halen. Dit broedgeval op het zogenaamde Ameland Westgat platform moet welhaast het meest noordelijke voor Nederland zijn.

Witte en rouwkwikstaarten worden overal op de Noordzee op offshore platforms gezien, zowel op de voor- als najaarstrek, maar broedgevallen worden in het recente overzicht van Thorpe (2001) niet gemeld. Desgevraagd heeft Andrew Thorpe laten weten dat er een enkele keer wel eens zangvogelnesten aan boord van platforms worden gevonden, maar altijd als zo'n platform net in een haven is geweest voor onderhoud. Dat zijn dus steeds zeer waarschijnlijk nesten geweest die in de haven zijn gemaakt, waarna ze zijn meegelift met het platform de zee op. Platform Ameland Westgat komt echter nooit van zijn plaats dus het hier gevonden nest moet ter plaatse zijn gemaakt. Na de vondst van de drieteenmeeuw als broedvogel op een platform op het Friese Front in 2000 en 2001 (Camphuysen & de Vreeze 2001), is dit weer een nieuwe broedvogelsoort op het NCP. Welke wordt de volgende, de aalscholver wellicht?



Foto: Nest van witte/rouwkwikstaart, aan boord van het offshore platform Ameland Westgat, zomer 2003.

Referenties:

- Camphuysen K. & de Vreeze F. 2001. Drieteenmeeuw *Rissa tridactyla* nieuwe broedvogel voor Nederland. Nieuwsbrief NZG 3(2): 1-2.
- Thorpe A.W. (Editor) 2001. The North Sea Bird Club, 21th Anniversary Report. The North Sea Bird Club, Aberdeen, 107 pp.

**Joop Marquenie, Nederlandse Aardolie Maatschappij
B.V. Postbus 28000, 9400 HH Assen**