

Rodgersii look-alike

Op 28 maart 2003 veroorzaakte Kees Camphuysen consternatie door binnen te lopen met een bijzondere vondst. Op de Waddendijk van Texel had hij de kop van een noordse stormvogel gevonden met een vrijwel zwart verenkleed. Een dergelijk donkere kleur komt in het noord Atlantisch gebied niet voor. Weliswaar is een “donkere” kleurfase zeer algemeen in diverse hoog-noordelijke Atlantische populaties (*Fulmarus glacialis glacialis*), maar zelfs de donkerste exemplaren daar zijn op zijn best donkergrijs, en bij lange na niet zwart. De zwartige kleur van dit exemplaar deed dan ook onmiddellijk denken aan de donkere vorm van Noordse Stormvogels in de noordelijke Grote Oceaan (*F.g. rogersii*) waar de kleurvariatie veel extremer is dan aan onze kant van de poolzee (zie SULA 9(3): 93-106 (1995)). De zwarte kleur werd niet veroorzaakt door teer of olie; hoewel het een vrij oude, ingedroogde schedel betrof, oogden de veren mooi schoon en droog, en dus kleur-echt’. Afgeplukte veertjes bleven, na geweekt te zijn in allerlei oplosmiddelen, dan ook onveranderd zwart (dus er was geen sprake van een olie- of vetachtige substantie op de veren).

Helaas, een goede wasbeurt van een der veertjes met gewoon warm water en zeep toonde toch aan dat we ons om de tuin hadden laten leiden. Zwart veranderde al snel in wit, d.w.z. de kopkleur zoals gebruikelijk bij de stormvogels uit onze omgeving (ondersoort *F.g. auduboni*). De namaakkleur was veroorzaakt door zeer fijn donker stof dat zich gelijkmatig sterk aan de veren had gehecht. Ook de maten van de snavel bleken prima te passen bij een mannetje uit bijvoorbeeld de Britse kolonies.

Waar deze *rogersii*-look-alike zijn spannende kleur had opgedaan, is onduidelijk. De vinddatum zou je haast doen denken aan een te vroege 1 april grap. Vogels zonder kop vinden we immers vaak, maar een kop zonder lichaam geeft te denken. Hoe dan ook, het was eventjes spannend.

Jan Andries van Franeker, De Houtmanstraat 46, Oudeschild (Texel)

