

### **Van internet geplukt: zeetrekten in Limburg**

Op 28 september 1994 werd door J. Maessen een verse, dode noordse pijlstormvogel gevonden langs de grote plas bij Panheel, in Limburg. Het betreft hier het meest verre binnenlandgeval voor Nederland. De vogel was als nestjonge geringd op Skomer langs de westkust van Wales op 9 september 1994 en werd dus binnen drie weken in Limburg dood teruggevonden. Waarschijnlijk is de jonge vogel tijdens de NW-storm van 16 en 17 september 1994 naar Limburg afgedwaald. Zeetrekters namen op deze twee dagen record trek van zeevogels waar (CvZ). Op 16 september verschenen als gevolg van de storm nog twee andere voor Limburg zeldzame zeevogelsoorten in onze provincie, namelijk een jan van gent bij Gennep (vondst) en een groep van maar liefst 11 kleine jagers boven Epen! (dank aan J. Maessen, fam. Wolters, H. Maeghs, K. Camphuysen en J. van der Coelen). Zie [http://www.pbase.com/ranschols/noordse\\_pijlstormvogel](http://www.pbase.com/ranschols/noordse_pijlstormvogel)) voor meerdere foto's van het inmiddels opgezette exemplaar.



**Ran Schols**

### **Zeetrekellingen december 2002 t/m maart 2003**

Gegevens voor dit overzicht zijn afkomstig van Scheveningen (Schev), Camperduin (Hbz) en Huisduinen (Huis), waar regelmatig werd geteld, en van Westkapelle (Weka), Noordwijk (Nw), Langevelderslag (Lvs) en Bloemendaal (Bloem) waar minder werd geteld.

Een korte vorstperiode bracht van 8 t/m 12 december bescheiden aantallen vogels in beweging. Te Schev passeerden deze dagen in totaal ca 8000 futen (Weka ca 3600) en 3800 wulpen. Verder noordelijk waren de aantallen beduidend lager. Op de 8e vlogen leuke aantallen bonte strandlopers naar zuid: Hbz 1687, Lvs 564, Schev 1432 en Weka 18. Op de laatste twee posten werden bovendien respectievelijk 1104 en 202 bergeenden, 2035 en 2370 kieviten, 1114 en 360 goudplevieren geteld. Langs Schev vloog een grauwe pijl. Te Lvs werd deze dag een vale pijl gezien, de eerste winterwaarneming in de CvZ-geschiedenis. Op 8 januari verbleef een grauwe pijl voor telpost Camperduin, en op 5 februari vloog hier een noordse pijl langs. Nog opvallender was de gedeeltelijk albino exemplaar dat 29 maart te Huis werd gezien (zie elders in deze nieuwsbrief).

Na de bescheiden influx van vorige winter werden in 2003 weer grote aantallen witbuikrotganzen gezien. In de eerste decade van januari werd een tiental naar zuid langs Schev gezien. Te Hbz werd de eerste opvallende verplaatsing op 8 januari opgemerkt: 2 Z, 68 N. In de nabijgelegen Putten verbleef vrijwel de gehele periode een groep. Beste dag was 16 februari: 4 Z, 192 N, 108 t.p.. Rotganzen waren relatief schaars, maar al vroeg in het seizoen werden aardige aantallen gezien: 28 februari 1347 N (Huis) en 1479 N te Hbz (plus 38 witbuikrotganzen). De beste dag was 21 maart: 1669 N te Huis. Brandganzen waren algemener, bijvoorbeeld 21 februari 1640 N (Hbz). Op 24 januari passeerden bij Weka 1886 kleine riet- en 1075 kolganzen. Begin januari werd te Hbz aanzienlijk minder eiders gezien dan de afgelopen jaren. Beste dag was 4 januari: 'slechts' 15.400 zuid. Elders werden geen opvallende aantallen gezien. Ook de trek van de meeste andere eenden was over het algemeen matig. Zo waren de beste dagen voor de smient 6 maart (Bloem 39 Z, 1588 N, plus 254 pijlstaarten) en 21 maart (Huis 1647 N). Op 23 maart werd langs Hbz aardige trek vastgesteld van o.a. slobbeend (318) en zomertaling (49). Zomertalingen vlogen ook langs Bloem (26) en Lvs (3), waar tevens 248 slobbeenden en 172 kluten werden geteld.

Duikers waren de eerste weken van 2003 opvallend talrijk. De hoogste aantallen passeerden 20 en 21 januari te Hbz, respectievelijk 1389 Z en 2009 Z, 23 N. In Zuid-Holland viel de beste dag op 25 januari: Lvs 491 Z. Dat de verplaatsingen van duikers zeer lokaal kunnen zijn bleek de volgende dag weer eens. Te Lvs passeerden 228 Z, 11 N, terwijl er langs het iets noordelijker gelegen Bloem 3 Z, 89 N vlogen.

Op 20 maart werd zeer sterke trek van bontjes vastgesteld: 5456 N te Hbz. Hiermee was de koek voor deze soort op. Enkele dagen later werd al goede trek van dwergmeeuw gezien: 29 maart Hbz 384 Z, 1389 N. Andere meeuwen waren schaars, al zijn 2575 kokmeeuwen N te Huis (20 mrt) het vermelden waard. De eerste grote sterns passeerden 8 maart (Hbz 2 N), elders werden de eerste vogels in de tweede helft van maart gezien.

Een (noord)westelijke stroming bracht 4 t/m 6 februari kleine alken voor de kust. Het hoogste aantal werd de 5e te Hbz gezien (28 Z, 8 N, 5 t.p.), elders werden maximaal twaalf vogels gemeld (Weka 5 feb). In dezelfde periode werden te Hbz 7 papegaaiduikers gezien en spoelden er grote aantallen aan in Noord- en Zuid-Nederland (zie Atl. Seabirds 5(1): 21-30). Van december t/m eind februari werden te Hbz in totaal 19 exemplaren gezien. Elders werden alleen te Weka in februari 3 papegaaiduikers gezien.