

tekst:
**Liesbeth ten
Hallers**

Met het korten van de dagen is de bollenplanttijd angebroken. Het is door een gebrek aan ooggetuigen nog wat duister in hoe-verre er op het vlindervriendelijke podium een rol weggelegd is voor de bloembol. Enkele soorten zijn intussen een nuttige en aangename verrijking van het vroegbloeiende nectarplantensortiment gebleken.

(*Tulipa tarda*) delicaat van kleur. Behalve vlindervoer levert dit bolgewasje ook aardige zaaddozen. Wacht met maaien tot het loof is afgestorven.

Op arme zandgrond bloeit jaar in, jaar uit de kleine, felblauwe *Scilla siberica*. Met een groenblijvend matje van een Rijstebrij-soort (*Arabis suendermanni*), gaat deze *Scilla* goed samen in een rotstuint, een bloembak of iets dergelijks. Deze *Arabis* bloeit behalve in mei-juni ook soms nog wat na in de herfst.

De Wilde hyacint (*Scilla non-scripta*) in blauw, rose en wit is kalkminnend en waardeert een humeuze bodem. De gewone enkelbloemige hyacint kunt u bij-

Naar de bollen.....

foto: Liesbeth ten Hallers



Scilla siberica, een voorjaarsbloeiër waarin vlinders nectar kunnen vinden.

Enige tijd geleden heeft er in 'Vlinders' een oproep gestaan om nectarbezoek aan bolgewassen door te geven. Alhoewel er nog niet zoveel waarnemingen binnen zijn gekomen als ik wel hoopte, kan ik natuurlijk wel mijn eigen ervaringen met vlinderbezoek met u delen.

Voor de overwintersaars

De lila Boerencrocus (*Crocus tommasi-nianus*) in mijn grasveld lokt de eerste passanten en dat zijn natuurlijk de overwinterende soorten, dus Citroentje, Kleine vos, Dagpauwoog en Gehakkelde aurelia. Op relatief warme, windstille dagen in februari en maart komen ze uit hun schulp. Mocht u in april wat zachtlila Pinksterbloemen in uw bloemenwei hebben staan, dan is hier een combinatie met een betrouwbaar, lichtgeel tulpje

voorbeeld met goede potgrond in bollenmandjes opplanten en ergens in de tuin, goed gemarkeerd, ingraven. Als de neuzen boven de grond komen, diept u het mandje voorzichtig op en laat het in een ruime, zonnig geplaatste bloembak zakken. De ruimte tussen de bollen vult u bijvoorbeeld aan met de tweejarige, nectarrijke Vergeetmijnietjes (*Myosotis sylvatica*), die zich intussen hopelijk heren der in uw tuin hebben uitgezaaid. De markt kan anders uitkomst bieden. Wanneer de hyacintenbloem verwelkt en het bollenloof minder fris is hebben de lichtblauwe myosotiswolkjes de bloembak intussen royaal gevuld. Even bruikbaar zijn winterharde violen, in deze tijd nog volop verkrijgbaar. Wanneer het geheel onmogelijk wordt laat u inhoud met mand en al ergens uit het zicht afsterven, waarna u de bollen root.

Ook zomerbloeiërs

Met Agapanthus of Eucomisbollen vullen we na de ijsheiligen de bloembak opnieuw. In augustus geven die een exotisch tintje aan uw terras, als de Citroentjes, witjes, Atalanta's en Gammauiltjes de bloesems één voor één 'afgrazen. Van bloeiend Gewoon en Chinees bieslook (*Allium schoenoprasum* en *A. tuberosum*) is bekend, dat het aanlokkelijk werkt.

Vermoedelijk zijn er veel meer Alliumsoorten interessant voor vlinders, maar gegevens hierover zijn mij niet bekend. De oproep geldt dus nog steeds: ziet u vlinders nectar drinken uit bepaalde bloembolgewassen, geef dit dan even door.