

Rijk bloeiende struiken zijn in de vlindertuin niet te versmaden. Vroeger bloeiend dan de Buddleja valt een botanische Sering in de prijzen en van de Kogelbloem zijn de late 'zomervogeltjes', zoals Maria Sybilla Merian ze noemde, zeker gecharmeerd, maar de standplaatseisen verschillen. Willen we de vlinders geen hongerbloempjes voorschotelen dan gunnen wij een plant de juiste plek.

Botanische Sering

Bent u met een bad opgegroeid? Nou, ik niet en dus vond ik als kind mensen met

Plant'aardig'

een echte badkamer 'deftig'. Wanneer je daar logeerde - ik spreek nu over de jaren veertig en vijftig - mocht je er nog maar bij hoge uitzondering van gebruik maken en het summum van genoeg was dan de geur van seringenzeep. Vlinders zijn geen badgasten, of het zou nectargebrek moeten zijn, dat ze in het heetst van de zomer naar een vogelbad lokt. Maar ook zij worden bekoord door het parfum van Seringen, ook wel Krunagelboompje of Nagelblom genaamd.

Bekende vlindertrekkers als

Phlox en Rode zonnehoed

(*Echinacea*) worden voor

mijn nieuwsgierige ogen door Atalanta's genegeerd als daarnaast een Botanische Sering, *S. microphylla* "Superba" staat te honingen; deze langzaam groeiende, krap twee meter hoge struik begint in mei te bloeien. Een periode, waarin het vlinderverkeer luw te noemen valt. Wat deze heester, die een verfijnde indruk maakt, grote waarde geeft, is de hoeveelheid donkerrose bloempluimen, die nadien nog tot in oktober toe te voorschijn blijven komen. Al op



jonge leeftijd bloeit de plant. Het kleine blad is twee tot vier cm en bijna eirond, de onderkant grijsgroen en min of meer behaard. Standplaatseisen: Ze floeren op een voedzame, goed doorlatende bodem in de volle zon (meer dan 7 uur zon per dag) en, zoals zo vaak, komt het wegnippen van de bloemen direct na de bloei de struik bepaald ten goede.

Kogelbloem

Een zure, natte veenbodem vormt een milieu, dat om een specifieke beplanting vraagt. De Noord-Amerikaanse *Cephalanthus occidentalis* of Kogelbloem kan hier op een zonnige plek gedijen en deze weinig toegepaste struik verdient, om het heel eigen karakter ook, een beter lot. De plant behoort tot de aromatische fami-

tekst:

Liesbeth ten Hallers

Kogelbloem.

FOTO: LIESBETH TEN HALLERS



en vlindervriendelijk

lie der Rubiaceeën oftewel Walstroachtigen. Op een zonnige standplaats vertonen zich in juli en augustus licht geurende, roomwitte, kogelronde bloemhoofdjes. Het blad staat in kransen of overstaand en kan tot 14 cm lang worden. Verwar deze heester niet met *Globularia*, die ook wel als Kogelbloem wordt aangeduid. Dit betreft een 15 cm hoog, groenblijvend rotsplantje met blauwe pluizenbolletjes in juni-juli; ook al aantrekkelijk voor vlinders, maar dan juist in kalkrijke grond. Andere nectardragende heesters voor de veentuin zijn mogelijk *Hydrangea aspera* *Macrophylla* (zie Vlinders jaargang 10 nr.1), de lang doorbloeiende Vuilboom (tevens waardplant voor het Citroentje en Boomblauwtje) en de bladverliezende, zeer welriekende gele Azalea (*Rhododendron luteum*). Voor de laatste twee soorten komt ook een drogere bostuin op humeus zand wel in aanmerking. Als bij u gewoonlijk in mei de Kleine vuurvliedertje vliegt biedt u met de voordelige zaailingen van bovengenoemde *Rhododendron* een plezierige pleisterplaats.

Botanische Sering.

FOTO: LIESBETH TEN HALLERS