



Verslagen

Verslag van de studiedag “*Crossocerus*”

Frank van der Meer

Veel leden van onze sectie houden zich vooral bezig met bijen; de andere aculeaten trekken iets minder de aandacht. Daarom was het verheugend dat er toch een naar verhouding vrij groot aantal aanwezigen verzameld was in het Zoölogisch Museum aan de Plantage Middenlaan op 1 februari j.l., nu het thema van de studiedag het determineren van de weinig kleurrijke leden van het graafwespengeslacht *Crossocerus* betrof.

Weinig kleurrijk; maar onze graafwespenvoorman Wim Klein was zélf aanwezig om ons door deze lastige groep te loodsen. Het charisma van Wim en de steeds toenemende handigheid van Hans Nieuwenhuijsen met de ‘microscoop met monitor’ bezorgden ons een allesbehalve saaie dag.

Ons werden overzichten van de families Sphecidae s.str. en Crabronidae verstrekt alsmede verspreidingskaartjes van de Nederlandse *Crossocerus*-soorten. Dat laatste was in ieder geval handig, want zolang de wespenatlas nog op zich laat wachten, is het plezierig om alvast van deze groep te weten of de soort die je op een bepaalde plek gevangen hebt daar ‘hoort voor te komen’ of niet. Maar op die Sphecidae s.str. en Crabronidae werd Wim meteen aangevallen: volgens de nieuwste inzichten schijnen de Sphecidae s.l. ingedeeld te moeten worden in drie families: de Ampulicidae, de Sphecidae s.str. en de Crabronidae. Dat zal best zo zijn, maar het was toch een beetje dipterengefilter (muggenzifterij) – en dat – foei! – op een Hymenopteren-dag. Over vijf jaar is het immers weer anders.

Veel belangrijker was dat enkele leden (waaronder ik) de schellen van de ogen vielen voor wat betreft de juiste determinatie van *Crossocerus ovalis*. En dat Wim systematisch en vasthoudend vrijwel alle inlandse soorten van het geslacht de revue liet passeren.

Eén van mijn valkuilen (waardoor het met *C. ovalis* wel eens mis ging) werd dichtgegooid: op pagina 14 van het Supplement van de Graafwespen van de Benelux, bij nr. 17 in de tabel van de mannetjes: bij ‘tergiet-7 veel sterker bestippeld dan tergiet-6’ wordt met ‘sterker’ ‘grover’ bedoeld, dus niet ‘meer’. Goed om dat er even bij te schrijven in uw exemplaar van de tabel van Wim.

Aan het einde van de dag konden we nog op de computer van Wim een aantal kleurenfoto’s bewonderen van de Hymenopterologen Tagung in Stuttgart in oktober 2002.

De gastvrijheid van Willem Hogenes van het ZMA was weer zoals vanouds.

Namens de aanwezigen bedankte Jan Smit onze leraar Wim terecht voor een leerzame dag.

Toch heb ik nog een vraag en een tip.

- 1) Waarom vang ik nooit een *Crossocerus megacephalus*?? Zit die ergens hoog in de bomen?? (wel al twee *Crossocerus walkeri* gevangen nota bene en die zijn veel zeldzamer).
- 2) Voor echte ‘*Crossocerus ovalis*’ moet je de Syntus-trein van Winterswijk naar Zutphen hebben. Daar zaten ze van de zomer aan de binnenkant tegen de ramen (“Papa, daar zit een graafwespje” – zoon Mark van 9 jaar) en het is nog een prachtig traject ook.