

Vooraankondiging extra excursie Bergerheide zaterdag 23 juni 2007

De extra excursie heeft dit jaar als bestemming de Bergerheide in Noord-Limburg en mogelijk enkele naburige terreinen. Het betreft een gevarieerd gebied met bossen en natte en droge heide, vennen, veentjes en stuifduinen.

Meld je alvast aan bij Jan Cuppen. De deelnemers ontvangen tegen die tijd een convocatie! De convocatie zal ook op onze website www.nev.nl/everts worden geplaatst.

Jan Cuppen, 0318-652039, jan.cuppen@wur.nl

Aanmelden weekendexcursie Serooskerke, Walcheren! 31 augustus tot 2 september 2007

Meld je alvast aan voor de weekendexcursie op Walcheren! Er zal voor een scala aan excursiegebieden vergunning worden aangevraagd, waaronder duinen, schorren, etc. We hoeven ons zeker niet te vervelen. De volledige convocatie zal verschijnen in de Everts Info van augustus (nr. 76) en op de website.

Aanmelding kan vanaf nú door € 45,- over te maken naar de penningmeester, gironummer 4058536 t.n.v. Sektie Everts te Smilde (of Utrecht), onder vermelding van "weekendexcursie 2007" (IBAN: NL47PSTB0004058536, BIC: PSTBNL21).

Verslag extra excursie Castenrayse Vennen (Limburg), 25 juni 2005

Bas Drost, Oscar Vorst, Jan Cuppen, Frank van Nunen

Op 25 juni 2005 werd de extra excursie georganiseerd naar de Castenrayse Vennen. Het is een laaggelegen gebied in het dal van de Lollebeek. Door stagnatie van het regenwater heeft hier eeuwenlang veenvorming plaatsgevonden. In het begin van de vorige eeuw is een groot deel ervan afgegraven, waardoor zeer natte laagten ontstonden. Het natuurgebied bestaat uit twee delen: het Castenrayse Broek, een langgerekt gebied langs de bovenloop van de Lollebeek en De Castenrayse Vennen, een komvormige verbreding van de beek met Elzenbroekbos, zandduintjes en grasland. Tijdens de excursie werden alleen de Castenrayse Vennen bemonsterd. Zoals gebruikelijk sommen we hier een aantal karakteristieke of opmerkelijke soorten op.

Het broekbos, waar overigens na de regenval van de afgelopen weken erg veel muggen actief waren, is door de meesten onderzocht. Op een boomstam, die over een natte greppel lag, groeide zwavelzwammen, die naast veel *Gyrophaena*-soorten *Scaphisoma*

balcanicum (een druppelvormig kevertje uit de familie Staphilinidae) opleverden en bovendien de zeldzame *Hallomenes binotatus*.

Aan de rand van het broekbos ligt een vochtig weijte met dotterbloem. Hier vonden we ondermeer *Prasocuris glabra*, *Stenus tarsalis* en *Cantharis nigra* als karakteristieke soorten.

Van daaruit verder lopend kwamen we bij een onbeschaduwde, gegraven drinkpoel, waarvan de oevers grondig uitgespoeld werden. Dit spoelen leverde veel exemplaren op van twee *Paederus*-soorten: *P. riparius*, *P. fuscipes* en de zeldzame *Paederidus ruficollis*. Deze laatste soort is ook in Noord-Brabant vaak van zandige oevers te spoelen. Aan de voet van een dode els werd *Tillus elongatus*, een zwarte Cleride met felrood halsschild gevonden.

De aangrenzende zandige loofbosjes werden begraasd door Schotse Hooglanders, en de mest ervan is vaak de moeite waard om te inspecteren: hierin bevonden zich de zeldzame *Baeocrara variolosa* en de korstschild *Aleochara intricata*. Deze laatste soort wordt tegenwoordig in West-Nederland niet meer gezien, maar in Limburg is het dier geen ongewone verschijning. Een braamstruweel langs een bosrand was de vindplaats van de mooi-rode Lycide *Lygistopterus sanguineus*. De houtkever *Anobium fulvicorne* werd hier samen met de kleine boktor *Leiopus fulvicorne* van de bomen aan de bosrand geklopt.

De Lollebeek zelf maakte, gezien de plantengroei, een voedselrijke indruk, wat bevestigd werd door de verzamelde waterkevers. Vermeldenswaard zijn alleen *Agabus didymus* en de kleine spinnende watertor *Hydrochara caraboides*.

Tabel 1. Lijst van de in de Castenrayse Vennen aangetroffen keversoorten op 25 juni 2005. De waarnemers zijn afgekort: JC=Jan Cuppen, OV=Oscar Vorst, FN=Frank van Nunen, BD=Bas Drost.

Taxon	Waarnemer		
HALIPLIDAE			
<i>Peltodytes caesus</i> (Duft.)	FN	<i>Hydroporus erythrocephalus</i> (L.)	JC
<i>Haliphus lineatocollis</i> (Marsh.)	FN BD	<i>Hydroporus memnonius</i> Nicol.	BD
<i>Haliphus fluviatilis</i> Aubé	FN BD	<i>Hydroporus neglectus</i> Schaum	JC BD
<i>Haliphus wehnckeii</i> Gerh.	FN BD	<i>Suphydrus dorsalis</i> (F.)	BD
<i>Haliphus immaculatus</i> Gerh.	FN BD	<i>Nebrioporus elegans</i> (Panz.)	FN
NOTERIDAE			
<i>Noterus clavicornis</i> (Deg.)	JC BD	<i>Laccophilus minutus</i> (L.)	JC
<i>Noterus crassicornis</i> (Müll.)	FN BD	<i>Laccophilus hyalinus</i> (Deg.)	FN
DYTISCIDAE			
<i>Hyphydrus ovatus</i> (L.)	FN	<i>Copelatus haemorrhoidalis</i> (F.)	FN BD
<i>Hydroglyphus pusillus</i> (F.)	JC	<i>Agabus bipustulatus</i> (L.)	JC BD
<i>Hygrotus impressopunctatus</i> (Schall.)	JC	<i>Agabus sturmii</i> (Gyll.)	BD
<i>Hygrotus inaequalis</i> (F.)	FN JC BD	<i>Agabus nebulosus</i> (Forst.)	BD
<i>Hygrotus decoratus</i> (Gyll.)	JC BD	<i>Agabus didymus</i> (Ol.)	BD
<i>Hydroporus angustatus</i> Sturm	FN BD	<i>Ilybius ater</i> (Deg.)	BD
<i>Hydroporus umbrosus</i> (Gyll.)	JC	<i>Rhantus suturalis</i> (M'Leay)	JC
<i>Hydroporus tristis</i> (Payk.)	JC	<i>Colymbetes fuscus</i> (L.)	JC
<i>Hydroporus gyllenhalii</i> Schdte.	JC	<i>Hydaticus seminiger</i> (Deg.)	JC
<i>Hydroporus palustris</i> (L.)	FN BD	<i>Graphoderus cinereus</i> (L.)	FN BD
<i>Hydroporus incognitus</i> Shp.	BD	<i>Acilius sulcatus</i> (L.)	BD
		<i>Acilius canaliculatus</i> (Nicol.)	FN JC BD
		<i>Cybister lateralimarginalis</i> (Deg.)	JC
		CARABIDAE	
		<i>Cicindela hybrida</i> L.	BD

<i>Cicindela campestris</i> L.	FN	<i>Neuraphes ruthenus</i> Mach.	OV
<i>Nebria brevicollis</i> (F.)	FN	<i>Euconnus hirticollis</i> (Ill.)	OV
<i>Omophron limbatum</i> (F.)	FN JC BD	SILPHIDAE	
<i>Elaphrus cupreus</i> Duft.	OV FN	<i>Oiceoptoma thoracica</i> (L.)	OV
<i>Elaphrus riparius</i> (L.)	DIV	<i>Phosphuga atrata</i> (L.)	BD
<i>Loricera pilicornis</i> (F.)	FN BD	STAPHYLINIDAE	
<i>Clivina collaris</i> (Hbst.)	FN	<i>Phyllodrepa ioptera</i> (Steph.)	OV
<i>Dyschirius arenosus</i> Steph.	OV FN	<i>Anthobium atrocephalum</i> (Gyll.)	OV
<i>Dyschirius aeneus</i> (Dej.)	DIV	<i>Metopsia clypeata</i> (Müll.)	OV
<i>Dyschirius luedersi</i> Wagn.	FN JC	<i>Megarthrus prosseni</i> (Schatzm.)	OV
<i>Dyschirius globosus</i> (Hbst.)	OV	<i>Proteinus laevigatus</i> Hochh.	OV
<i>Bembidion varium</i> (Ol.)	FN	<i>Micropeplus staphylinoides</i> (Marsh.)	OV
<i>Bembidion tetricolum</i> Say	FN	<i>Bibloplectus ambiguus</i> (Reichb.)	OV
<i>Bembidion femoratum</i> Sturm	OV FN	<i>Rybaxis longicornis</i> (Leach)	OV
<i>Bembidion doris</i> (Panz.)	FN BD	<i>Carpelimus rivularis</i> (Motsch.)	OV JC
<i>Bembidion articulatum</i> (Panz.)	FN JC BD	<i>Carpelimus impressus</i> (Boisd.Lac.)	OV
<i>Bembidion lunulatum</i> (Geoffr.)	OV	<i>Carpelimus corticinus</i> (Grav.)	OV JC
<i>Anisodactylus binotatus</i> (F.)	BD	<i>Oxytelus laqueatus</i> (Marsh.)	OV BD
<i>Harpalus anxius</i> (Duft.)	JC BD	<i>Anotylus rugosus</i> (F.)	OV
<i>Stenolophus teutonus</i> (Schrk.)	FN JC	<i>Anotylus sculpturatus</i> (Grav.)	OV BD
<i>Stenolophus mixtus</i> Hbst.	FN	<i>Anotylus complanatus</i> (Er.)	OV
<i>Acupalpus flavigollis</i> (Sturm)	JC	<i>Anotylus tetracarinatus</i> (Block)	OV
<i>Acupalpus brunnipes</i> (Sturm)	OV FN JC	<i>Platystethus arenarius</i> (Fourcr.)	OV BD
<i>Acupalpus parvulus</i> (Sturm)	DIV	<i>Platystethus alutaceus</i> Thoms.	OV JC BD
<i>Poecilus versicolor</i> (Sturm)	BD	<i>Stenus comma</i> Lec.	OV JC BD
<i>Pterostichus minor</i> (Gyll.)	FN	<i>Stenus juno</i> (Payk.)	OV
<i>Pterostichus niger</i> (Schall.)	FN JC	<i>Stenus boops</i> Ljungh	OV JC
<i>Agonum marginatum</i> (L.)	FN	<i>Stenus incrassatus</i> Er.	OV
<i>Agonum micans</i> Nicol.	FN	<i>Stenus canaliculatus</i> Gyll.	OV BD
<i>Agonum fuliginosum</i> (Panz.)	OV FN BD	<i>Stenus formicetorum</i> Mannh.	OV
<i>Agonum thoreyi</i> Dej.	OV BD	<i>Stenus tarsalis</i> Ljungh	BD
<i>Paranchus albipes</i> (F.)	FN	<i>Stenus cicindeloides</i> (Schall.)	BD
<i>Oxypselaphus obscurus</i> (Hbst.)	OV	<i>Stenus fornicateus</i> Steph.	JC
<i>Amara aenea</i> (Deg.)	FN JC BD	<i>Stenus nitidiusculus</i> Steph.	BD
<i>Syntomus foveatus</i> (Geoffr.)	BD	<i>Euaesthetus ruficapillus</i> Boisd.Lac.	OV
LEIODIDAE		<i>Paederus fuscipes</i> Curt.	OV JC BD
<i>Anisotoma humeralis</i> (F.)	BD	<i>Paederus riparius</i> (L.)	OV BD
<i>Nargus anisotomoides</i> (Spence)	OV	<i>Paederidus ruficollis</i> F.	OV JC BD
HYDRAENIDAE		<i>Scopaeus laevigatus</i> (Gyll.)	OV JC
<i>Hydraena testacea</i> Curt.	OV	<i>Lathrobium elongatum</i> (L.)	OV
PTILIIDAE		<i>Erichsonius cinerascens</i> (Grav.)	OV BD
<i>Ptenidium laevigatum</i> Er.	OV	<i>Philonthus fumarius</i> (Grav.)	OV
<i>Ptenidium fuscocrine</i> Er.	OV	<i>Philonthus tenuicornis</i> Rey	OV
<i>Ptenidium nitidum</i> (Heer)	OV	<i>Philonthus splendens</i> (F.)	OV
<i>Ptiliolum fuscum</i> (Er.)	OV	<i>Philonthus fimetarius</i> (Grav.)	OV
<i>Baeocraea variolosa</i> (Muls.)	OV	<i>Philonthus quisquiliarius</i> (Gyll.)	OV JC BD
<i>Acrotrichis grandicollis</i> (Mannh.)	OV	<i>Philonthus marginatus</i> (Ström)	OV
<i>Acrotrichis dispar</i> (Matth.)	OV	<i>Gabrius piliger</i> Muls.Rey	OV
<i>Acrotrichis atomaria</i> (Deg.)	OV	<i>Gabrius breviventer</i> (Sperk)	OV
<i>Acrotrichis sitkaensis</i> (Motsch.)	OV	<i>Quedius cruentus</i> (Ol.)	BD
<i>Acrotrichis henrici</i> (Matth.)	OV	<i>Othius myrmecophilus</i> Kiesw.	OV
SCYDMAENIDAE		<i>Xantholinus linearis</i> (Ol.)	OV

<i>Xantholinus longiventris</i> Heer	BD	<i>Aphodius rufus</i> (Moll)	BD
<i>Tachinus laticollis</i> Grav.	BD	<i>Anomala dubia</i> (Scop.)	JC
<i>Tachinus marginellus</i> (F.)	OV	HELOPHORIDAE	
<i>Tachinus corticinus</i> Grav.	OV	<i>Helophorus aequalis</i> Thoms.	JC BD
<i>Tachyporus solutus</i> Er.	BD	<i>Helophorus brevipalpis</i> Bedel	OV JC BD
<i>Sepedophilus testaceus</i> (F.)	BD	<i>Helophorus obscurus</i> Muls.	OV JC BD
<i>Sepedophilus immaculatus</i> (Steph.)	OV	<i>Helophorus minutus</i> F.	JC
<i>Myllaena dubia</i> (Grav.)	OV BD	HYDROCHIDAE	
<i>Myllaena minuta</i> (Grav.)	OV	<i>Hydrochus carinatus</i> Germ.	OV BD
<i>Gyrophaena affinis</i> Mannh.	BD	<i>Hydrochus angustatus</i> Germ.	JC BD
<i>Gyrophaena minima</i> Er.	OV BD	HYDROPHILIDAE	
<i>Gyrophaena bihamata</i> Thoms.	OV BD	<i>Sphaeridium lunatum</i> F.	OV JC
<i>Gyrophaena angustata</i> (Steph.)	OV BD	<i>Cercyon impressus</i> (Sturm)	OV
<i>Homalota plana</i> (Gyll.)	BD	<i>Cercyon melanocephalus</i> (L.)	OV BD
<i>Bolitochara obliqua</i> Er.	BD	<i>Cercyon marinus</i> Thoms.	JC
<i>Bolitochara bella</i> Märk.	BD	<i>Cercyon lateralis</i> (Marsh.)	OV
<i>Autalia impressa</i> (Ol.)	OV	<i>Cercyon pygmaeus</i> (Ill.)	OV BD
<i>Autalia rivularis</i> (Grav.)	OV	<i>Cercyon tristis</i> (Ill.)	FN
<i>Thinonoma atra</i> (Grav.)	OV	<i>Cercyon convexiusculus</i> Steph.	OV
<i>Atheta elongatula</i> (Grav.)	OV	<i>Cercyon sternalis</i> Shp.	OV
<i>Atheta palustris</i> (Kiesw.)	OV	<i>Cercyon analis</i> (Payk.)	JC
<i>Atheta nigricornis</i> (Thoms.)	OV	<i>Megasternum concinnum</i> (Marsh.)	OV
<i>Atheta harwoodi</i> Will.	OV	<i>Cryptopleurum minutum</i> (F.)	OV
<i>Atheta orphana</i> (Er.)	OV	<i>Hydrobius fuscipes</i> (L.)	BD
<i>Atheta canescens</i> (Shp.)	OV	<i>Anacaena globulus</i> (Payk.)	OV FN BD
<i>Atheta sordidula</i> (Er.)	OV	<i>Anacaena limbata</i> (F.)	OV FN BD
<i>Atheta aeneicollis</i> (Shp.)	BD	<i>Anacaena lutescens</i> (Steph.)	FN JC
<i>Atheta ravilla</i> (Er.)	OV	<i>Laccobius bipunctatus</i> (F.)	OV FN
<i>Atheta crassicornis</i> (F.)	BD	<i>Laccobius minutus</i> (L.)	OV FN JC
<i>Atheta macrocera</i> (Thoms.)	BD	<i>Helochares lividus</i> (Forst.)	JC
<i>Atheta longicornis</i> (Grav.)	OV	<i>Helochares obscurus</i> (Müll.)	BD
<i>Acrotona aterrima</i> (Grav.)	OV	<i>Helochares punctatus</i> Shp.	JC
<i>Acrotona parvula</i> (Mannh.)	OV	<i>Enochrus testaceus</i> (F.)	FN
<i>Zyras cognatus</i> (Märk.)	OV	<i>Enochrus affinis</i> (Thunb.)	JC
<i>Phloeopora testacea</i> (Mannh.)	OV	<i>Enochrus coarctatus</i> (Gredl.)	BD
<i>Ocyusa maura</i> (Er.)	OV	<i>Cymbiodyta marginella</i> (F.)	BD
<i>Oxypoda elongatula</i> Aubé	OV	<i>Chaetarthria seminulum</i> (Hbst.)	DIV
<i>Thiasophila inquilina</i> Märk.	OV	<i>Chaetarthria similis</i> Wollaston	FN
<i>Tinotus morion</i> (Grav.)	OV	<i>Hydrochara caraboides</i> (L.)	BD
<i>Aleochara intricata</i> Mannh.	OV	HISTERIDAE	
<i>Aleochara sparsa</i> Heer	OV	<i>Margarinotus ventralis</i> (Mars.)	OV BD
<i>Aleochara lanuginosa</i> Grav.	BD	<i>Margarinotus striola</i> Sahlb.	OV
<i>Scaphisoma agaricinum</i> (L.)	OV BD	<i>Hister unicolor</i> L.	BD
<i>Scaphisoma balcanicum</i> Taman.	OV BD	SCIRTIDAE	
SCARABAEIDAE		<i>Microcara testacea</i> (L.)	DIV
<i>Onthophagus similis</i> (Scriba)	OV JC BD	<i>Cyphon coarctatus</i> Payk.	DIV
<i>Onthophagus coenobita</i> (Hbst.)	OV	<i>Cyphon ochraceus</i> Steph.	OV JC
<i>Oxyomus sylvestris</i> (Scop.)	OV	<i>Cyphon laevipennis</i> Tourn.	FN BD
<i>Aphodius fossor</i> (L.)	JC BD	<i>Cyphon hilaris</i> Nyh.	OV FN BD
<i>Aphodius rufipes</i> (L.)	OV	DRYOPIDAE	
<i>Aphodius depressus</i> (Kug.)	OV	<i>Dryops luridus</i> (Er.)	BD
<i>Aphodius ater</i> (Deg.)	OV	HETEROCERIDAE	

<i>Heterocerus fenestratus</i> (Thunb.)	FN	<i>Cis micans</i> (F.)	BD
<i>Heterocerus hispidulus</i> Kiesw.	OV FN JC	<i>Ennearthron cornutum</i> (Gyll.)	OV
ELATERIDAE		MELANDRYIDAE	
<i>Prosternon tessellatum</i> (L.)	JC	<i>Hallomenus binotatus</i> (Quensel)	BD
<i>Hemicrepidius niger</i> (L.)	JC	MORDELLIDAE	
<i>Athous haemorrhoidalis</i> (F.)	JC	<i>Mordellistena</i> sp. (Panz.)	BD
LYCIDAE		TENEBRIONIDAE	
<i>Lygistopterus sanguineus</i> (L.)	OV	<i>Lagria hirta</i> (L.)	BD
CANTHARIDAE		<i>Crypticus quisquilius</i> (L.)	FN
<i>Cantharis nigra</i> (Deg.)	JC BD	<i>Diaperis boleti</i> (L.)	OV BD
<i>Cantharis livida</i> L.	FN	<i>Corticeus unicolor</i> Pill.Mitt.	OV
<i>Cantharis pallida</i> Goeze	JC	OEDEMERIDAE	
<i>Rhagonycha testacea</i> (L.)	BD	<i>Oedemera lurida</i> (Marsh.)	JC
<i>Malthinus punctatus</i> (Fourcr.)	BD	SCRAPTIIDAE	
ANOBIIDAE		<i>Anaspis frontalis</i> (L.)	JC
<i>Anobium fulvicorne</i> Sturm	JC	CERAMBYCIDAE	
CLERIDAE		<i>Stenurella melanura</i> (L.)	FN
<i>Tillus elongatus</i> (L.)	OV	<i>Leiopus nebulosus</i> (L.)	JC
MELYRIDAE		CHRYSOMELIDAE	
<i>Dasytes plumbeus</i> (Müll.)	BD	<i>Cryptocephalus nitidus</i> (L.)	FN
<i>Malachius bipustulatus</i> (L.)	JC	<i>Cryptocephalus moraei</i> (L.)	FN
<i>Axinotarsus marginalis</i> (Cast.)	OV	<i>Cryptocephalus vittatus</i> F.	JC
KATERETIDAE		<i>Cryptocephalus labiatus</i> (L.)	JC
<i>Kateretes rufilabris</i> (Latr.)	BD	<i>Chrysolina varians</i> (Schall.)	FN
<i>Brachypterus urticae</i> (F.)	JC	<i>Prasocuris glabra</i> (Hbst.)	FN BD
<i>Brachypterus glaber</i> (Steph.)	JC	<i>Chrysomela populi</i> L.	BD
SILVANIDAE		<i>Phratora laticollis</i> (Suffr.)	BD
<i>Uleiota planata</i> (L.)	OV	<i>Galeruca tanaceti</i> (L.)	FN
PHALACRIDAE		<i>Aphthona nonstriata</i> (Goeze)	BD
<i>Olibrus baudueri</i> Flach	JC	<i>Altica oleracea</i> (L.)	FN
EROTYLIDAE		<i>Asioresta transversa</i> (Marsh.)	FN BD
<i>Dacne bipustulata</i> (Thunb.)	BD	<i>Epitrix pubescens</i> (Koch)	FN
CERYLONIDAE		<i>Cassida sanguinosa</i> Suffr.	FN
<i>Cerylon histeroides</i> (F.)	OV	APIONIDAE	
COCCINELLIDAE		<i>Perapion violaceum</i> (Kirby)	JC
<i>Chilocorus renipustulatus</i> (Scriba)	BD	<i>Perapion marchicum</i> (Hbst.)	JC
<i>Hippodamia variegata</i> (Goeze)	JC	<i>Perapion curtirostre</i> (Germ.)	JC BD
<i>Adalia decempunctata</i> (L.)	BD	<i>Apion cruentatum</i> Walt.	JC
<i>Adalia bipunctata</i> (L.)	JC	<i>Apion rubiginosum</i> Grill	JC
<i>Coccinella septempunctata</i> L.	JC	ERIRHINIDAE	
<i>Oenopia conglobata</i> (L.)	JC	<i>Stenopelmus rufinasus</i> Gyll.	JC
<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas)	JC BD	<i>Tanysphyrus lemnae</i> (Payk.)	OV JC
<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (L.)	FN BD	<i>Notaris acridula</i> (L.)	BD
CORTICARIIDAE		CURCULIONIDAE	
<i>Cartodere nodifer</i> (Westw.)	OV	<i>Phyllobius pomaceus</i> Gyll.	JC
<i>Cortinicara gibbosa</i> (Hbst.)	JC	<i>Phyllobius argentatus</i> (L.)	BD
MYCETOPHAGIDAE		<i>Curculio venosus</i> (Grav.)	BD
<i>Mycetophagus quadripustulatus</i> (L.)	BD	<i>Magdalis cerasi</i> (L.)	BD
CIIDAE		<i>Hypera arator</i> (L.)	JC
<i>Sulcacis fronticornis</i> (Panz.)	BD	<i>Rhinoncus castor</i> (F.)	JC
<i>Cis setiger</i> Mell.	BD	<i>Micrelus ericae</i> (Gyll.)	JC