



pantserjuffers *Lestes viridis* was uitgevoerd door dagelijks per kano een 50 m lang stuk oever te controleren binnen het uitsluipseizoen van deze soort. Hier bleek de belangrijkste sterfte (2,1 %) te worden veroorzaakt door wespen (*Vespula germanica* en *V. rufa*) die soms met een twintigtal tegelijk daar aanwezig waren. Verder bleken larven van deze soort regelmatig tijdens regenbuien te zitten wachten op een opklaring om te kunnen gaan uitsluipen. Ook bleken ze bij regenachtig weer hoger uit sluisen dan bij droog weer, om te voorkomen dat ze via opspattende regendruppels zouden omkomen.

In de omgeving van Kaiserlautern werd onderzoek aan de Vroege glazenmaker *Aeshna isosceles* uit 1985 en 1986 vergeleken met de situatie in 2003.

Opvallende verschillen waren een twee weken eerder vliegen van de soort, ondanks het feit dat zowel 1986 als 2003 hete zomers waren. Verder waren er in 2003 meer dieren aanwezig en deze werden aanzienlijk minder teruggevangen. Dit duidde op een zwerflustiger bestaan.

Tot slot blijkt de dichtstbijzijnde populatie van de Sierlijke witsnuitlibel *Leucorrhinia caudalis* op 140 km van de Nederlandse grens te liggen in het Duitse Saarland (op de hoogte van Luxemburg) en kan je het beste in de middag zoeken naar de Bronslibel *Oxygastra curtisii* omdat ze 's ochtends aan het water niet actief zijn.



Foto: De deelnemers aan de 23. Jahrestagung der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen (GdO) 19-21 maart 2004 in Oldenburg (D)

Foto: Marcel Wasscher

Beekrombout (GOMPVULG) nu ook langs Zwarte Water (O)

De opmars van de beekrombout (GOMPVULG) lijkt niet te stuiten. Sinds 2002 komt deze soort voor langs de gehele Overijsselse Vecht. In 2003 en 2004 zijn de aantallen sterk toegenomen. De Vecht stroomt ten Noorden van Zwolle in het Zwarte Water, welke uiteindelijk uitmondt in het Zwarte Meer. Onlangs zag Jeroen Bredenbeek in Hasselt een zonnende beekrombout.

Op 16 mei trof Leo Winter bij de brug in Hasselt een uitsluipend exemplaar aan.

Evert Ruiter

