Inhaalslag Rivierrombout

Nieuws over *Gomphus flavipes* in het kader van de inhaalslag habitatrichtlijnsoorten.

Leukste nieuws is dat de soort nu in bijna elk 5 bij 5 kmhok langs de IJssel is aangetroffen.
De eerste twee weken van juli 2004 is er veel veldwerk uitgevoerd voor het in kaart brengen van de verspreiding van de Rivierrombout. Bijna alle 5 bij 5 km-hokken waar de soort nog niet was waargenomen zijn in de afgelopen periode bezocht. Door het aanhoudende matige weer is het veldwerk vrij laat van start gegaan. Hierdoor waren de gevonden aantallen vrij laag. Het veldwerk is uitgevoerd door Pepijn Calle (Maas), Vincent Kalkman (Maas), KD Dijkstra (IJssel), Jaap Bouwman (Maas). Aanvullende waarnemingen werden ontvangen van Bram Koese, Marcel Wasscher, Ernst Jan Haafen en Evert Ruiter.
Hoewel we eigenlijk al wisten dat de soort verspreid door het hele rivierengebied aanwezig is waren de resultaten toch erg leuk. Het was reeds bekend dat de soort op meerdere plekken langs de IJsel voorkomt. Toch was het verrassend dat de soort bijna in elk 5 bij 5 km-hok aangetroffen kon worden. In het centrale rivierengebied was de soort reeds bekend van een groot aantal hokken (zie waarnemingenverslag 2004). De soort is daar vooral algemeen langs de Waal. Toch konden er dit jaar ook hier weer enkele nieuwe 5 bij 5 kmhokken voor de soort gevuld worden. Veel minder waarnemingen zijn bekend van de NederRijn en tot dit jaar werd de soort niet verder westelijk werd aangetroffen dan omgeving Rhenen en Wageningen. Begin juli is de soort zo'n 30 km westelijker aangetroffen (Lek) en de soort is nu op minder dan 10 km van de Domtoren taangetroffen.
De Maas blijft voor de Rivierrombout de slechtste rivier. De meeste 5 bij 5 kmhokken van de Maas zijn reeds bezocht en nergens heeft dit succes opgeleverd. De rivier is hier voor een groot deel ingebed en bijna nergens zijn strandjes aanwezig. Komende jaren moet hier wel verder worden gezocht aangezien er vast op enkele plekken kleine populaties aanwezig zijn. Huidjes van de soort zijn tot half augustus te vinden en we hopen dat er nog mensen zijn gaan kijken. Vooral langs de Lek moet de soort nog om meerdere nieuwe plekken te vinden zijn.

Vincent Kalkman & Jaap Bouwman

Foto: Harm Niesen

Bruine winterjuffer *Sympecma fusca* in Noord- Drenthe

Tijdens mijn vakantie (half augustus) vond ik Bruine winterjuffers (redelijk vers) in een slootje aan het Leekstermeer (coord. 224.1-577.1 en 224.0-577.5). Ik zag zeker drie exemplaren. Eén ervan vloog langs de oever van de Leekstervaart (tweede coördinaat) tussen het Leekstermeer en Leek. Tot nu toe zijn van de Bruine winterjuffer alleen waarnemingen in Z -W Drenthe bekend.

Rob van der Es

Vuurlibellen

Dit jaar noordelijke waarnemingen van Vuurlibellen *Crocothemis erythraea* in Flevoland en Drenthe . Hieronder enkele vondsten:

1. *Kuinderbos (Flv) twee exemplaren (vangst), 10 -8, De Vlinderstichting*
2. *Uffelter Binnenveld (Dr) 1 ♂ 18-8, P.van Wely*
3. *Nijenslekerveld (Dr) 1 exemplaar (vangst) 28-8, J. Bredenbeek.*