





EIS-Nederland start digitale nieuwsbrief ongewervelden



TENTAKEL

Nieuws over ongewervelde dieren



EIS-Nederland is in juli gestart met een digitale nieuwsbrief over ongewervelde dieren. *Tentakel* zal onregelmatig verschijnen naast de reguliere papieren nieuwsbrief van EIS. De nieuwsbrief is opgezet als Internetpagina (in HTML) en kan in de meest gangbare email-programma's worden gelezen. Via de links kan eenvoudig alleen dat nieuws er uit gepikt worden dat u interesseert.

In *Tentakel* is plaats voor allerlei korte berichten die het onderzoek aan ongewervelde dieren in Nederland aangaan: berichten van het EIS-bureau, oproepen, bijzondere en fenologische waarnemingen, aankondiging van rapporten en boeken en een activiteitenagenda. Ook bijdragen van andere organisaties zijn van harte welkom. U kunt deze sturen naar eis@ncbnaturalis.nl. De eerste *Tentakels* zijn online te bekijken op <http://www.redcube.nl/~colijn/eis/tentakel1.html>. Aanmelding voor de nieuwsbrief is mogelijk door een e-mail te sturen naar eis@ncbnaturalis.nl.

Ed Colijn

Uitsluitende platbuiken op grote afstand van het water

Van de beweeglijkheid van de larven van libellen is weinig bekend. Elke nieuwe of afwijkende waarneming is zinvol om te documenteren. Zo is het bekend dat larven van de smaragdlibbel (*Cordulia aenea*) voor het uitsluitende tot ver buiten het water kruipen en hoog in boomstammen klimmen (Geijskes & Van Tol 1983). Afstanden van 30 meter en 5 meter hoogte worden genoemd. Het vinden van exuviae op dergelijke afstand van het water is geen sinecure. Het lijkt zelfs voor een deel te berusten op geluk. Van dat zelfde geluk moet je het soms ook hebben als het gaat om andere soorten libellen.



In de Atlas van Nederlandse Libellen (2002) is te lezen dat exuviae van platbuik (*Libellula depressa*) op wel 4 meter afstand van het water worden gevonden. Op 28 mei 2010 wordt door Willy van de Wetering in een tuin in Doetinchem een vers exemplaar van de platbuik gevonden, met het exuvium er direct onder. De vindplaats is een ongebruikelijke. Vanuit de tuinvijver heeft de larve een afstand van hemelsbreed 7,70 meter afgelegd en is 40 centimeter tegen een opgevouwen parasol gekropen. Dit is de dubbele afstand van tot op heden bekend. Ook de ondergrond is interessant. Het metaal en katoen steekt af ten opzichte van het gebruikelijke plantaardig materiaal als stengels of stammen. De geschiktheid van de locatie lijkt belangrijker dan het materiaal.

Bas van de Wetering

