

## Rockanje strand

Anton Janse\*

Het dorp Rockanje ligt nabij de westelijke punt van het voormalige eiland Voorne in de provincie Zuid-Holland. In de loop van de twintigste eeuw heeft dit van oorsprong agrarische dorp zich samen met het enkele kilometers noordelijker gelegen Oostvoorne, ontwikkeld tot badplaats. Hoofdzakelijk ten behoeve van de Rotterdamse regio.

Op wat kleinere schaal is dat nog steeds het geval. Alhoewel de laatste decennia het strandgenoegen meer verplaatst is naar Benidorm en andere exotische oorden is er op beperkte schaal nog steeds sprake van een badplaats. Merendeels bestaande uit dagrecreatie.

Na het afsluiten van het Haringvliet is het strand daar nauwelijks veranderd, zij het dat de Punt van Voorne verder afkalft door het veranderde stroompatroon vanwege het ontbreken van permanente eb- en vloedstroom uit respectievelijk Haringvliet en Brielse Maas. Deze afslag wordt regelmatig gecompenseerd door strandsuppleties.

De laatste suppletie heeft ongeveer anderhalf jaar geleden plaatsgevonden. Hierbij is een interessante verspoelde Eemfauna, afkomstig uit de voordelta aan land gebracht. Uitvoerig verslag hiervan is opgetekend in Afzettingen van december 2005.

Liefhebbers voor de strandwandeling kunnen zich melden bij Stef Mermuys, tel. 010-5214771, email: stef.mermuys@lansingerland.nl of Anton Janse, tel. 0181-416238, email: acjanse@hetnet.nl (zie ook de bijgevoegde convocatie).



Vanuit Rotterdam is de lokatie goed per openbaar vervoer bereikbaar.



Een andere melding van dit strand staat in de oktober editie van dat jaar, in de rubriek Opmerkelijke vondsten.

Het voornemen bestaat om binnenkort een excursie naar dit strand te ondernemen.

Het als eerste aangebrachte sediment is door golfslag en verwerking, zeker het kleinere materiaal, grotendeels verdwenen. Recente stormafslag van het strand brengt echter steeds weer vers materiaal naar boven. Het blijft echter een gok of zo'n strandwandeling veel oplevert. Afhankelijk van weer en windrichting, zeker in de daarop voorgaande dagen, maken of het vondstpercentage positief of negatief uitvalt.

Grotere stukken zijn minder erosie gevoelig, zodat botten en artefacten vrijwel altijd te vinden zijn.

Aansluitend aan mijn suppletieverhaal van 2005 staat een soortenlijst. Deze breidt nog steeds uit. Een recent bezoek aan dit strand leverde een goedbewaarde klep en topfragment van *Megacardita planicosta lerichei* op. Niet echt Eemien zult u zeggen, maar verrassingen zijn altijd mogelijk.

Mar had nog meer geluk, zij vond de punt van een harpoen van been, die een ijstijd jager in de strijd had gebroken, vervolgens een gave *Diodora apertura* en tenslotte een drie centimeter grote klep van *Hiatella arctica*, de koude vorm dus.

Anton Janse, Brielle 2007, acjanse@hetnet.nl

