
Er zijn aanwijzingen dat er in de afgelopen maanden sprake is geweest van een invasie van barmsijzen in Gooi en omstreken. Om er achter te komen of die aanwijzingen juist zijn, zijn al uw waarnemingsgegevens nodig.

Pieter Schut

Was er een invasie van barmsijzen in het Gooi?

Het voorkomen van de barmsijzen is in onze streek wisselvallig. Het ene jaar worden er in herfst en winter slechts enkele exemplaren gezien, het andere jaar zijn er juist veel. De barmsijzen arriveren vanaf oktober en vertrekken in april weer noordwaarts. Om te onderzoeken of er de afgelopen herfst en winter werkelijk sprake was van een invasie, wil Pieter Schut (tel. 035-6936811) hier enig onderzoek naar doen. Hij zal dit dan verwerken in een artikel voor De Korhaan.

Daartoe zijn uiteraard alle gegevens van belang. Vooral van de afgelopen maanden, maar ook oudere waarnemingen zijn interessant. Het aanmelden van gegevens kan het beste via de bekende waarnemingskaartjes. Ook zou het bij het speuren naar barmsijzen aardig zijn te letten op ondersoorten. Van de barmsijzen zijn er twee ondersoorten die in Gooi en omstreken kunnen voorkomen, de grote barmsijzen en de kleine barmsijzen. Daarnaast kan sporadisch de witstuitbarmsijzen worden gezien. Door gebrek aan studie is over de verschillende soorten weinig bekend.

Dat komt voornamelijk omdat het alleen voor echte specialisten mogelijk is onderscheid te maken tussen grote- en kleine barmsijzen. De **grote barmsijzen** (*Carduelis flammea flammea*) is

de meest noordelijke vorm. De meeste waarnemingen uit onze omgeving hebben waarschijnlijk betrekking op deze soort.

De **kleine barmsijzen** (*Carduelis flammea cabaret*) is iets donkerder en produceert een andere roep. Deze ondersoort broedt op diverse plaatsen in West- en Midden-Europa. In Nederland voornamelijk in de duinstreek, in Drente en op de Veluwe. Wie het onderscheid niet met zekerheid kan vaststellen, meldt gewoon barmsijzen (*Carduelis flammea*), Euringcode 16630. De **witstuitbarmsijzen** (*Carduelis hornemanni*) is goed te onder-

scheiden van de "gewone" barmsijzen. Hij is duidelijk lichter dan z'n familielid en heeft een zuiver witte ongestreepte stuit. Toch zal het nog niet meevallen hem in de kijker te krijgen. Sedert 1972 zijn in Gooi en omstreken minder dan twintig waarnemingen bekend.

Barmsijzen zijn vaak te vinden op plekken waar ook putters en zijzen graag verblijven. In loofbossen, berken, wilgestruiken en vooral op elzen, liefst in een vochtige omgeving, maar ook soms gewoon in de tuin. Let er, zo lang het nog geen lente is, eens extra op.