
In 2000 werden de broedvogels op de Tafelberg- en Blaricummerheide geïnventariseerd.

Dick A. Jonkers

Hoge recreatiedruk en toch toevluchtsoord

In 2000 is op de Tafelberg- en Blaricummerheide een broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat de diversiteit aan broedvogels daar nog steeds groot is. Dit ondanks de hoge recreatiedruk en een honden-aanlijn-gebod, dat massaal wordt genegeerd. Er is één soort vastgesteld die op de Rode Lijst voorkomt: de roodborsttapuit. Op de Tafelbergheide waren 19 verschillende broedvogelsoorten met in totaal 93 territoria aanwezig; op de Blaricummerheide waren dat er respectievelijk 21 en 95.

De veldleeuwerik kwam op beide heidevelden voor met enkele tientallen broedparen. Sinds de massale achteruitgang in het Nederlandse agrarische cultuurlandschap zijn de heidevelden voor deze soort een toevluchtsoord geworden. Voor droge heidevelden kenmerkende soorten als boomleeuwerik en boompieper hadden er eveneens territoria. Door plaatselijk optredende

verbossing hielden er zich ook nogal wat bosvogelsoorten op. Zowel bij de bergeend als de tapuit is waargenomen dat deze op zoek waren naar nestholten. Mogelijk is het ontbreken van door konijnen gegraven hollen voor deze soorten een beperkende factor.

Vergeleken met eerder uitgevoerde inventarisaties is het aantal broedparen van heidevogels aanzienlijk toegenomen. Dit verschijnsel is ook op andere heidevelden in Nederland geconstateerd. Die gunstige ontwikkeling op de Tafelberg- en Blaricummerheide zou niet mogelijk zijn zonder het op het behoud van de heide gerichte beheer van het Goois Natuurreservaat gedurende de afgelopen decennia...

Bron:

Broedvogels in 2000 op de Tafelberg- en Blaricummerheide. Subgroep Avifauna. Dick A. Jonkers. Uitgave 122. Vogelwerkgroep het Gooi en omstreken, Hilversum. 30 p. + bijlagen.