

Rectificatie verslag tuinvogelonderzoek

In het artikel over het tuinvogelonderzoek in de vorige Korhaan komen helaas enkele storende fouten voor. Zo is de tabel op pagina 37 bijna onleesbaar geworden en blijkt daar niet uit dat de auteur niet kon beschikken over de gegevens over 1993. Deze tabel had er als volgt uit moeten zien.

Tabel 1: Overzicht 1992 - 1999. Winter. Percentage tuinen, waarin de genoemde soorten zijn gezien. Gemiddelde over de weken 1 t/m 9 voor de meest voorkomende soorten. *

Jaar	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99
Koudegetal winter* *	34	41	63	22	151	132	19	47
Houtduif	43	-	57	59	65	71	67	65
Turkse Tortel	44	-	56	57	64	75	78	76
Winterkoning	32	-	38	33	40	22	27	27
Heggenmus	59	-	69	70	76	73	69	82
Kramsvogel	0	-	0	3	38	3	0	2
Zanglijster	3	-	3	6	17	7	4	11
Koperwiek	2	-	1	1	18	11	0	11
Merel	94	-	96	90	97	99	95	99
Roodborst	76	-	81	79	84	77	74	81
Koolmees	91	-	86	93	93	97	92	91
Pimpelmees	73	-	81	90	81	88	81	87
Staartmees	13	-	28	36	33	33	27	26
Boomklever	14	-	8	6	11	19	11	6
Boomkruiper	5	-	5	4	10	8	5	8
Groenling	34	-	38	30	36	45	38	26
Sijs	5	-	25	29	14	30	60	13
Vink	65	-	74	72	75	86	77	83
Huismus	64	-	68	65	49	64	59	65
Ringmus	9	-	5	7	10	22	17	7
Spreeuw	64	-	72	69	76	76	70	72
Zwarte Kraai	13	-	11	5	16	18	13	18
Kauw	53	-	58	55	63	59	56	67
Ekster	55	-	59	66	63	62	62	67
Vlaamse Gaai	24	-	28	27	33	43	35	29

* De laatste weken van het winterseizoen zijn al duidelijke overgangsweken en zijn om die reden in deze tabel niet meegenomen.

* *Website: www.knmi.nl

Verder kwamen in het originele verslag nog de volgende grafieken voor:

Fig.1: Houtduif en Turkse Tortel




Fig.2: Kraaiachtigen (winter)





Fig. 3: Tjiftjaf (Zomer)



Wij bieden de auteurs onze excuses aan voor het ontbreken van deze grafieken en vertrouwen dat hiermee de zaak weer is recht gezet.