

De Bovenmeent: steeds weer goed voor een aangename verrassing.

Frank Derriks

Opnieuw gestreepte strandloper in de Bovenmeent

Donderdagavond 19 juli 2001 fietste ik naar de Bovenmeent en daar aangekomen bleken er weer veel steltlopers aanwezig te zijn. Naar schatting 20 watersnippen, 10 witgatjes, 5 oeverlopers, maar liefst 40 bosruiters, 1 zwarte ruiter, 3 tureluurs, 140 kemphanen en zeker 250 grutto's, grotendeel juveniele exemplaren, en enkele bontbek- en kleine pleviertjes. Ook vlogen er boven de bosrand een wespendif, een boomvalk, een buizerd en boven de plassen ook nog een bruine kiekendief.

Op een gegeven moment (20.00 uur) kreeg ik vlak langs het fietspad een forse strandloper in het oog, die al gauw wegdook achter een pluk pitrus. Even later liet hij zich bij vlagen weer heel goed bekijken. Hij had een middellange, aan het eind omlaaggebogen snavel. De gestreepte borst sloot juveniele kemphaan uit. Toen ik zag dat de streping op de borst abrupt stopte, was het wel duidelijk. Het ging om een ge-

streepte strandloper, en wel om een juveniel exemplaar. Bij de gestreepte strandloper is dat het mooiste kleed omdat het verenkleed erg vers is en er op de dekveren mooie witte zoompjes te zien zijn. Verder had hij lichtgele pootjes, een witte buik, donkere teugel en een lichte oogstreep. De vogel foerageerde tussen enkele kemphanen en bosruiters, maar was door de hoge begroeiing soms moeilijk te zien. Een paar keer vloog hij op omdat er een bruine kiekendief overvloog. Rond 21.00 uur was hij weer op dezelfde plek aanwezig. Na 21.45 uur werd het te donker en ben ik weer terug naar huis gegaan om hem te melden. De dag erna heb ik hem niet kunnen terugvinden.

Tot en met 1998 zijn er 80 waarnemingen bekend van de gestreepte strandloper in Nederland. De meeste zijn gezien in de Flevopolder en rond het Lauwersmeergebied. Ook uit de

kop van Noord Holland, met name de bollenvelden achter de duinen aldaar, de Putten en Den Oever, zijn waarnemingen bekend. In het Gooi is de gestreepte strandloper voor het eerst gezien in 1981 bij de Stichtse brug. De tweede waarneming was eind september 1999 van wel drie exemplaren in een baggerdepot ten oosten van het Naardermeer. In mei 2000 was een volwassen exemplaar aanwezig in de Bovenmeent aan de zuidkant van het fietspad. En deze vogel van 19 juli 2001 was dus de vierde waarneming voor het Gooi. Ik ben erg benieuwd wat er allemaal in het najaar wordt gezien aan strand- en steltlopers in de Meent.

Literatuur:

Svensson, L. & P.J. Grant, 1999. ANWB Vogelgids van Europa. Vogelbescherming NL Tirion Baarn.

Berg, A.B. van den & C.A.W. Bosman, 1999. Zeldzame vogels van Nederland. G.M.B. Haarlem / K.N.N.V. Utrecht