

Dick A. Jonkers & Fernand Jager

Tuinvogels in 2001

Deze herfst verscheen het verslag van het tuinvogelonderzoek in 2001. De 32 deelnemers noteerden 65 verschillende vogelsoorten die van hun tuin gebruik maakten. Tussen die soorten bevonden zich enkele die het apart noemen wel waard zijn. Zo zijn grote gele kwikstaart, fluiters, vuurgoudhaantjes, kleine vliegenvangers en appelvinken gesignaleerd. De toptien in de wintermaanden werd aangevoerd door de merel, gevolgd door koolmees, roodborst, pimpelmees, heggenmus, Turkse tortel, vink, houtduif, ekster en spreeuw. De huismus viel er net buiten en moest genoegen nemen met de elfde plaats. Vergelijken met voorgaande jaren begint de aanwezigheid van Turkse tortels weer toe te nemen.



Merel

De vogelrijkdom in de deelnemende tuinen is sinds het begin van het onderzoek in 1992 vooruit gegaan. Deze toename is groter in de zomer dan in de winter. Er blijkt vanaf 1995 in de zomerperiode een significant negatief verband te bestaan tussen koolmees en pimpelmees. Een toename van de koolmes

gaat gepaard met een afname van de pimpelmees. Goudhaantjes vertoonden in de winter een forse toename. In de herfst zijn meer goudhaantjes waargenomen dan in voorgaande jaren, een verschijnsel dat ook in 2000 is geconstateerd.

De huismus lijkt in de zomerperiode een geringe daling te vertonen. Boomklevers lieten een flinke toename zien in de zomer en de herfst, een fenomeen dat bij de boomkruiper in de winter en de lente optrad. Voorts is de aanwezigheid van opmerkelijk hoge aantallen gaaien in de herfst vastgesteld.

Jager, F.C. & D.A. Jonkers 2002. Tuinvogelonderzoek 2001. Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Hilversum. Uitgave 126. 12 p.