
De vegetatieverandering op het eiland de Dode Hond is mogelijk de oorzaak van de wijziging van het vogelbestand.

Dick A. Jonkers

Inventarisatie eiland de Dode Hond 2002

Nadat in 1992 het eiland de Dode Hond in het Eemmeer op broedvogels was geïnvventariseerd, is dit in 2002 opnieuw uitgevoerd. Vergeleken met het inventarisatiejaar 1992 leverde 2002 eveneens 39 verschillende soorten broedvogels op. Het waren niet allemaal dezelfde soorten, want er verdwenen er acht en er vestigden zich ook acht nieuwe. Van het merendeel van de soorten was er een zeer

grote afname van het aantal territoria. De grootste achteruitgang werd geconstateerd bij de soorten die in de struik- en bodemvegetatie broeden. Het lijkt erop dat de voortschrijdende successie hiervoor verantwoordelijk is. Het overgroeien van rietrestanten is hier een voorbeeld van. Havik en buizerd broeden nog steeds op het eiland, maar sperwer en bruine kiekendief verdwenen.

Opmerkelijk was de nieuwe vestiging van fazant, wielewaal en het voorkomen van een paartje boomklevers. Van laatstgenoemde weinig mobiele soort bevinden de reguliere broedplaatsen zich op ongeveer zes kilometer afstand in de oude bossen van het Gooi.

Jonkers, D.A. 2003. Broedvogels van het eiland de Dode Hond in 2002. Subgroep Avifauna Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken, Hilversum. Uitgave 136.