
Het tuinvogelonderzoek is nu zijn dertlende jaar ingegaan. Juist deze lange periode van waarnemen maakt het mogelijk bepaalde verbanden te ontdekken. Zoals tussen Spreeuwen en wintertemperatuur. Jarenlang was de Huismus stabiel, maar deze lijkt nu ook in het Gooi te gaan afnemen.

Fernand C. Jager en Dick A. Jonkers

Tuinvogelonderzoek in 2003

De vogeltoptien zag er voor de wintermaanden van 2003 als volgt uit: Merel, Koolmees, Pimpelmees, Vink, Roodborst, Ekster, Heggenmus, Houtduif, Spreeuw en Kauw. De Turkse tortel is uit de toptien verdwenen.


De Huismus staat op de twaalfde plaats. Een opvallende zesde plaats voor de Ekster. Het aantal tuinen met Spreeuwen blijkt in de winter positief gecorreleerd te zijn aan het koudegetal; dat wil zeggen: hoe kouder de winter hoe meer tuinen met Spreeuwen. In de zomermaanden werd een zwak negatief verband gevonden tussen het aantal tuinen met Eksters en het aantal tuinen met Huismussen. De Huismus vertoonde zowel in winter als zomer een geringe afname. Er waren

veel Sijzen in de winter, maar weinig in de herfst. Forse toename van Eksters in de winter en van Gaaien in de zomer.

Opmerkelijke verschillen tussen het Gooi, Almere en Engeland. Houtduif, Turkse Tortel en Kauw komen in Almere weinig voor. Boomklever en Boomkruiper vrijwel niet, maar Huismussen veel meer dan in het Gooi. Engeland valt op door hogere aan-

tallen Zwarte mees, Zanglijster en Groenling.

Meer informatie is te vinden in het verslag over 2003: "Tuinvogels 2003"; Fernand C. Jager en Dick A. Jonkers. Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken, Hilversum. Uitgave 139 (2004). Er zijn nog enkele exemplaren van dit verslag beschikbaar.



Koolmees

Illustratie: J. Weenink