

Nieuwe uitgaven van de Vogelwerkgroep

Publicaties zijn te lenen uit de verenigingsbibliotheek. De medewerkers krijgen gratis een exemplaar.

Dick Jonkers

Broedvogels in Gooise nestkasten in 2008

Na de afsluiting van het broedseizoen 2008 is er over een aaneensluitende periode van jaar onafgebroken nestkastonderzoek in het Gooi uitgevoerd. Een prestatie van formaat. Er is er weer heel wat afgesjouwd om vast te stellen welke broedvogels gebruik maakten van de 1246 gecontroleerde Gooise nestkasten. Meer dan driekwart daarvan was bezet. Helaas zijn twee terreinen (Eikenrode en Sypestein in Loosdrecht) met in totaal 59 nestkasten niet gecontroleerd. Dat is jammer, want hiermee is een waardevolle en zeer lange controlereeks onderbroken. Liefhebbers voor het onderzoeken van de nestkasten op deze landgoederen kunnen zich kunnen zich opgeven bij de onderzoekcoördinator Ronald Beskers (zie de rubriek Uit de veren). Gemiddeld controleerden de 18 medewerkers bijna 75 nestkasten. In totaal herbergden de

nestkasten dertien verschillende soorten broedvogels. Het aantal broedsels van de dominante soorten Kool- en Pimpelmees was ongeveer gelijk aan dat van 2007. Hierbij moet wel bedacht worden dat er dit jaar enkele gebieden niet zijn bekeken en vergelijkingen dan niet opgaan. Net als elders in het land blijft het aantal broedsel van de Zwarte Mees zorgelijk, hoewel er dit jaar wat meer paren waren. Door meer controles van de voor Holenduiven geschikte kasten waren de resultaten beter. Er vonden 16 eerste broedsels plaats, dertien tweede en drie derde. In enkele kasten nestelden Winterkoningen en Roodborsten. Het aantal Bonte Vliegenvangers nam iets af, maar op lang termijn is de situatie stabiel. Er werd nog maar één broedgeval van een Gekraagde Roodstaart vastgesteld.

Beskers, R.E.. 2008. Goois Nestkastonderzoek. Jaarverslag 2008. Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Hilversum. Uitgave 174

Vogeltellingen in de tuin

Met de regelmaat van een klok verschijnt ieder jaar het verslag over het tuinvogelonderzoek, dat inmiddels al 16 jaar aan de gang is. Hieraan hebben in 2008 38 leden deelgenomen, waarvan een aantal dit al vanaf het begin doet. In totaal namen zij in 2007 67 verschillende vogelsoorten waar. Daar zaten er diverse bij die zich normaliter niet zo snel in tuinen vertonen. Houtsnip, Grote Gele Kwikstaart, Zwarte Roodstaart en Vuurgoudhaan vallen onder die groep. Vanaf 2004 liet het voorkomen van de Huismus in de tuinen een stijging zien. De soort stond op de elfde plaats van meest voorkomende vogels. In de broedtijd nam het percentage tuinen toe waarin de soort werd waargenomen. Dit wordt

toegeschreven aan het uitzwermen van de ouders, die op zoek gaan naar voedsel voor hun jongen. Omdat uit de winterperiode de meeste gegevens binnenkomen, is het aantal soorten berekend dat gemiddeld per week aanwezig is. Van 1992 tot 2003 nam dit toe van 10,0 naar 13,9; daarna is er geen duidelijke toename meer. Er is een poging gedaan om te berekenen wanneer de eerste Roodborsten en Vinken weer verschenen in de herfst. Dat bleek gemiddeld respectievelijk in de eerste en tweede week van november te zijn. Daarna bleven beide soorten zich tot in de derde week van mei vertonen. Dit laatste vraagt om nader onderzoek !

Jager F.C. 2008. Tuinvogels 2007. Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Hilversum. Uitgave 175.