

Staartblauwtje

Everes argiades



Het staartblauwtje komt voor in een groot deel van Midden-Europa. Vroeger kwam de soort in Wallonië voor, maar is daar inmiddels uitgestorven. Omstreeks het midden van de negentiende eeuw was de soort zeldzaam in de omgeving van Bremen, maar ook daar komt hij nu niet meer voor. De dichtstbijzijnde populatie vliegt nu in het zuidelijke Rijnland in Duitsland. (LEMPKE 1954).

De waardplanten zijn verschillende soorten vlinderbloemigen, vooral moerasrolklaver *Lotus pedunculatus*. De soort leeft in vochtige vrij ruige, extensief begraasde wei- en hooilanden. In Bretagne leeft de soort in heiden. Hij vliegt in twee tot drie generaties tussen midden mei en eind september en overwintert als volwassen rups. De weinige Nederlandse exemplaren waarvan de exacte datum bekend is, zijn alle van eind augustus. In de literatuur staat dit blauwtje bekend als vrij honkvast, maar zwervers zijn tot in Groot-Brittannië gevonden. (BINK 1992).

Het staartblauwtje is een dwaalgast die minstens tienmaal is waargenomen. De laatste vondst is uit 1933 van een onbekende vindplaats. De overige negen waarnemingen zijn nog ouder: Leiden (ZH, vrouwtje, zonder datum), Varsseveld (OV, vrouwtje, zonder datum), Zuid-Limburg (LI, vrouwtje zonder datum), Zutphen (GE, zonder datum), Varsseveld (OV, vrouwtje, augustus 1857), Empe (GE, 1850-1860), Hummelo (GE, twee mannetjes 24 en 26 augustus 1909 en een vrouwtje op 24 augustus 1909) en Utrecht (UT, 1924). Daarnaast is er een literatuurvermelding van Snellen (1867) van 'zeldzaam in Nederland, hier en daar in de Achterhoek' en vermeldt De Graaf (1853) een exemplaar van St. Michielsgestel (NB) die later ook door Snellen is overgenomen.

SUMMARY

Short-tailed Blue *Everes argiades*

Everes argiades is a vagrant. It has been seen at least ten times; the last sighting was in 1933.

Rotsvlinder

Lasiommata maera



De rotsvlinder komt in een groot deel van Europa voor, behalve in Groot-Brittannië, delen van Noordwest-Europa en Noord-Scandinavië. De dichtstbijzijnde populaties vliegen in de Ardennen en de Eifel.

De waardplanten zijn diverse grassen. De soort leeft in graslanden op steenachtige hellingen. Hij vliegt in één generatie tussen eind juni en eind juli, in Zuid-Europa vliegt hij in twee generaties over een langere periode tussen eind april en september. Hij overwintert als halfvolgroeide rups. De soort is vrij honkvast. (BINK 1992).

De rotsvlinder is een dwaalgast die in totaal zeven maal is waargenomen. De laatste waarneming dateert van 1933 van een onbekende vindplaats. De overige waarnemingen zijn: Breda (NB, zonder datum, mannetje, vrouwtje), Rijsbergen (NB, 29 juli 1866, mannetje, vrouwtje (in de literatuur vermeld Heylaerts (1870) 'enige exemplaren'), Breda (NB, 2 juli 1870), Vaals (LI, 2 juli 1870), Nijmegen (GE, 1890-1900, mannetje) en Ginneken (NB, juni 1899).

SUMMARY

Large Wall Brown *Lasiommata maera*

Lasiommata maera is a vagrant that has been seen seven times; the last sighting was in 1933.