

Zomererebia

Erebia aethiops



De zomererebia komt voor van Polen tot Midden-Frankrijk, de Balkan en oostwaarts tot de Oeral. In Schotland leeft een geïsoleerde populatie. De dichtstbijzijnde populaties vliegen in zeer klein aantal in de Belgische Ardennen en de Duitse Eifel.

De waardplanten zijn verschillende grassoorten. De soort leeft in schrale graslanden en ruigten bij bosranden en matig vochtige graslanden met struiken en bomen. Hij vliegt in één generatie tussen eind juli en begin september. Volgens de literatuur is de soort honkvast. (BINK 1992).

De zomererebia is de slechtst gedocumenteerde dagvlinder van de Nederlandse lijst. Vermoedelijk is hij eenmaal in Nederland gevonden. Dit exemplaar bevond zich in de dupla-verzameling van J.Th. Oudemans. Het was in die tijd gebruikelijk om de fraaiste of bijzonderste vlinders in een hoofdverzameling te houden die getoond werd aan bezoekers. Daarnaast bestond er vaak nog een tweede 'dupla-verzameling' - zeg maar duplicaten- of schaduwverzameling - met de overige exemplaren. Op het etiket bij deze zomererebia is door Oudemans met potlood geschreven: 'vlgns Jeswiet door hem in de duinen gevangen (?)': dit is in de periode tussen 1910 en 1930 geweest. Professor Jeswiet heeft aan de vlinderconservator van het Zoölogisch Museum Amsterdam verklaard dat hij, toen hij zijn vlinders aan Oudemans gaf, geen buitenlandse vlinders bezat noch ooit in het buitenland was geweest. Overigens heeft dhr. Jeswiet wel in Zuid-Limburg verzameld. (KRUSEMAN 1940, LEMPKÉ 1957).

SUMMARY

Scotch Argus *Erebia aethiops*

Erebia aethiops is a vagrant that has been seen once 'in the Dunes'. The species is the most controversial on the Dutch List. The sole specimen is from the dupla-collection of J.Th. Oudemans, who wrote 'in the Dunes' on the etiquette with a questionmark. However, the original collector said that he himself had never been abroad.

Voorjaarserebia

Erebia medusa



De voorjaarserebia komt voor in een beperkt deel van Midden-Europa. De dichtstbijzijnde populaties leven in de Eifel en de Belgische Ardennen, waar de soort niet zeldzaam is, maar wel achteruit gaat. Hij staat als 'kwetsbaar' op de Europese Rode lijst (VAN SWAAY & WARREN 1999).

De waardplanten zijn verschillende grassoorten. De soort leeft in schrale droge (kalk)graslanden. Daarnaast wordt hij ook gevonden in ruigere, voedselarme vochtige hooilanden en open bossen in heuvelachtige gebieden. Hij vliegt in één generatie tussen midden mei en eind juni en overwintert als halfvolgroeide rups. In de literatuur wordt de soort vermeld als honkvast. (BINK 1992).

De voorjaarserebia is een dwaalgast die viermaal is waargenomen. Van één vondst zijn datum en locatie onbekend. De overige vindplaatsen liggen alle in Zuid-Limburg: Onderste bos bij Epen (25 mei 1920, twee mannetjes en een adult), Vaals (11 juni 1947 en één mannetje) en bij Vijlen (24 juni 1954, één mannetje, één vrouwtje). In Vlaanderen is deze soort nog in 1996 gevonden; een nieuwe vondst blijft dus mogelijk. (MAES & VAN DYCK 1999).

SUMMARY

Woodland Ringlet *Erebia medusa*

Erebia medusa is a vagrant that has been seen four times; three records are from the south of the province of Limburg, the other location is unknown.