grauwe ganzen, zodat het relatieve aandeel zakte naar rond de 70%. In 2003 zakt het relatieve aandeel naar 30% door de plotselinge toename van de grauwe gans. De opkomst van de brandgans zorgt voor een verdere daling, ondanks het feit dat de aantallen knobbelzwanen niet af lijken te nemen.
In de maanden april en mei nemen de aantallen sterk af, om in juni te stabiliseren op een laag niveau. Dit heeft te maken met het inzetten van de rui, waarvoor knobbelzwanen open water opzoeken. Alleen de broedvogels met jongen blijven dan achter. De aantallen suggereren dat er in de polder maximaal enkele tientallen nesten zijn, wat ook wel klopt met de indruk die ik heb. Het overgrote deel van de vogels in april en mei betreft dan waarschijnlijk niet-broedende knobbelzwanen.
Van de andere soorten is de Canadese gans nog van enig belang. Het betreft hier waarschijnlijk vooral ganzen die in de omgeving broeden. De aantallen zijn in het voorjaar lager dan in de rest van het jaar. Ze maken minder dan vijf procent uit van de totale aantallen in deze periode. De kolgans komt in sommige jaren tot half april nog met wat grotere groepen voor. De aantallen stijgen de laatste jaren. Gemiddeld ligt de bijdrage van deze soort nu ook rond vijf procent. Andere soorten zijn alleen in kleine aantallen aanwezig.

Geraadpleegde literatuur

Cramp S. and Simmons (eds.) 1977 The Birds of the Western Palearctic. Vol 1. Oxford University Press, Oxford.
Mooij, J. 2006. De Knobbelzwaan in de Eempolders. De Korhaan 40(1) 11-12.
Mooij, J. 2008. De Grauwe Gans in de westelijke Eempolders. De Korhaan 42(3) 56-57.
Mooij, J. 2009. De Nijlgans in de westelijke Eempolders. De Korhaan 43(3) 88-89.
Mooij, J. 2009. Het voorkomen van de Canadese Gans in de westelijke Eempolders. De Korhaan 43(5) 145-146.
Mooij, J. 2010. Het voorkomen van de Kolgans in de westelijke Eempolders. De Korhaan 44(5) 161-162.
Mooij, J. 2013. Het voorkomen van de Brandgans in de westelijke Eempolders. De Korhaan 47(2) 60-61.
Mooij, J. 2013. Graseters in de westelijke Eempolders. De Korhaan 47(4) 145-147.
Mooij, J. 2013. Graseters in de westelijke Eempolders in de periode januari tot en met maart. De Korhaan 47(5) 145-147.

Wat zien ik ?

Goudvink in januari met nestmateriaal

De natuur is helemaal van slag in deze zachte winter. Op tal van plaatsen staan struiken en planten al te bloeien. Ook de vogels zijn van slag. Een heel aparte waarneming deed ik op 26 januari j.l. bij de Woensberg in Blaricum. Daar zaten een mannetje en vrouwtje goudvink in een Amerikaans krentenboompje (*Amelanchier lamarckii*). Het mannetje had een grashalmpje in zijn snavel. Even later vloog het vrouwtje weg, maar het mannetje bleef zitten. Van goudvinken is bekend dat de vrouwtjes het nest bouwen en de mannetjes halmpjes aandragen. Dit wordt baltsvoederen genoemd. Het is wel erg vroeg om dit gedrag te vertonen, want in het algemeen wordt pas in april begonnen met broeden.

Dick A. Jonkers



Bron: Glutz von Blotzheim_& Bauer 1997