

**Charonia (Charonia) lampas (Linné, 1758) (Gastropoda: Cymatiidae)  
levend aangetroffen in het Nauw van Calais**

J. DE LIGT

Gladiolenlaan 4, 1731 XV Winkel

*Charonia lampas* is reported alive from off Dover. The species here reaches the extreme southern part of the North Sea. Earlier records from the NE. Atlantic part of the range are listed.

Key words: Gastropoda, Prosobranchia, *Charonia lampas*, distribution, Straits of Dover.

Op 15 maart 1986 werd door de Belgische koter Z 66 (Nelson) een levend opgeviste *Charonia (C.) lampas* (Linné, 1758) in de vissershaven van Zeebrugge aan land gebracht. De schelp is 173 mm hoog en 90 mm breed. De koter had gevist rond 51°00' N 1°30' O in het Nauw van Calais, op een diepte van ongeveer 40 m. Visser L. Wilham haalde het dier uit het net en nam het mee voor de heer J.P. Kreps. Dat het niet om een verdwaald exemplaar, maar om een populatie, van *C. lampas* moest gaan, bleek ongeveer zes weken later. Op 30 mei 1986 kwam dezelfde koter terug met nog twee levend op 25 mei opgeviste *Charonia's* uit het Nauw van Calais. De kleinste schelp, waarbij het operculum verloren was gegaan, is 164 × 79 mm, terwijl het grootste exemplaar 213 × 110 mm meet.

Bij het nagaan van de bekende verspreiding van deze opvallende soort langs de kusten van Groot-Brittannië en Ierland (Seaward, 1982) bleek het om een buiten het bekende verspreidingsgebied gelegen vindplaats te gaan. De drie bovengenoemde exemplaren bevinden zich inmiddels in de collectie van de auteur.

Volgens o.a. Kiliyas (1973: 58) moet de naam *C. (C.) rubicunda* (Perry, 1811) voor onze soort gebruikt worden; *C. (C.) nodifera* (Lamarck, 1822) is een synoniem. Op deze plaats kan hier niet nader op worden ingegaan.

Om een beter beeld van het meest noordelijke deel van het verspreidingsgebied van *C. lampas* te verkrijgen, volgt een overzicht van de vondsten die geregistreerd werden door The Conchological Society of Great Britain and Ireland (Seaward, 1982).

(1) In augustus 1825 werd de soort aangetroffen bij de Casquet, een rotspartij 20 mijl noordelijk van Guernsey. Hierna werden tot 1847 nog drie of vier verdere exemplaren rond Guernsey verzameld (Jeffreys, 1867: 302). Crowley (1961) geeft voor dit materiaal de volgende schelphoogten op: 136, 203, 229, en 254 mm.

(2) In de jaren 1970-1971 werden vier vondsten gemeld van de zuidwestkust van Ierland (O'Riordan, 1972). Alle exemplaren werden levend opgevisst en bevonden zich nu in het National Museum of Ireland te Dublin: 8 april 1970, tussen Sybil Head en Inshooskert, ca. 90 m diep, 1 ex., 125 × 63 mm; 8 juli 1971, zuidelijk van Great Blasket, 1 ex., 145 × 73 mm; 15 november 1971, 9 mijl zuidwestelijk van Great Blasket, ca. 90 m diep, 1 ex., 97 × 58 mm; 16 november 1971, Wild Bank, 3 mijl zuidelijk van Sleah Head, 1 ex.

(3) Na 125 jaar werden er in 1972 weer twee vondsten gedaan bij Guernsey (Brehaut, 1973): juli 1972, 9 mijl zuidelijk van Guernsey, 2 ex., levend (een slak met een schelphoogte van 220 mm werd in het zee-aquarium van Guernsey ondergebracht, terwijl het andere exemplaar waarschijnlijk verloren ging); september 1972, Hurt Deep, iets noordelijk van de Casquet, 1 ex., levend (het is onduidelijk waar dit exemplaar zich bevindt).

(4) De enige vondst van de Britse zuidwestkust werd gedaan tussen 18 en 21 maart 1975 (Turk, 1976). Toen werd een levend exemplaar opgevist van een diepte van ongeveer 80 m, 5-6 mijl zuidoostelijk van Wolf Rock (49°52' N 5°42' O). Het geconserveerde dier bevindt zich in het Marine Biological Association's Museum te Plymouth.

Graag wil ik hier de heer J.P. Kreps danken voor het afstaan van het materiaal en het verstrekken van de bijbehorende gegevens en de heer R.G. Moolenbeek voor het doen toekomen van de nodige literatuur.

#### LITERATUUR

- BREHAUT, R.N., 1973. The occurrence of *Charonia lampas* (L.) at Guernsey. — *J. Conch.*, London 28: 41-42.
- CROWLEY, T.E., 1961. F.C. Lukis and the Triton. — *J. Conch.*, London 25: 17-20.
- JEFFREYS, J.G., 1867. *British conchology* 4: 1-487. Londen.
- KILIAS, R., 1973. *Gastropoda/Prosobranchia Cymatiidae*. — *Tierreich* 92: i-viii, 1-235. Berlijn/New York.
- O'RIORDAN, C.E., 1972. Two species of gastropod Mollusca new for the Irish fauna. — *J. Conch.*, London 27: 371-372.
- SEAWARD, D.R., 1982. *Sea area atlas of the marine molluscs of Britain and Ireland*: 1-242. Shrewsbury.
- TURK, S.M., 1976. *Charonia lampas* (L.) (Gastropoda: Cymatiidae) living off the Cornish coast. — *J. Conch.* London 29: 29-30.