

HUISJESSLAKKEN IN TUINEN

door

A.D.J. Meeuse

Dit stukje gaat over de situatie in Noord-Holland, maar elders in Nederland zal het wel niet veel anders zijn. In een niet al te opgeruimde tuin met een schaduwhoek en enige vochtigheid, die niet te ver af ligt van een bos, struweel of beplanting of grenst aan een andere tuin, treft men naast de schadelijke cultuurvolger *Helix aspersa* (de segrijnslak) niet zelden enkele exemplaren van *Cepaea nemoralis* en bij voldoende vochtigheid ook van *Arianta arbustorum* aan. Mogelijkerwijs kan in bepaalde delen van ons land (ook) *C. hortensis* in tuinen binnendringen. Voor zover ik kan nagaan richten deze huisjesslakken, met uitzondering van de zeer vraatzuchtige segrijnslak, nauwelijks schade aan het gewas aan. Ik beveel dan ook aan hen (behalve de laatste uiteraard) niet te verdelgen - een teveel kan altijd worden teruggebracht naar de plaats waar zij vermoedelijk vandaan kwamen. Er is nog een andere reden waarom ik aanbeveel *Cepaea* en *Arianta* te sparen. Als er zanglijsters in uw tuin komen of in de buurt rondhangen ruimen zij de huisjesslakken op (ook niet te forse segrijnslakken), want die staan op hun menu. De lijsters pikken de slakkenhuizen stuk op een harde ondergrond (terrasje, stoeprand, steen, boomwortel etcetera) ten einde de inhoud te kunnen verorberen. Het is leuk om het getik te horen in het besef de vogelstand te bevorderen.

Voor een niet-malacologisch geïnteresseerde tuinliefhebber is elke slak een slak en per definitie schadelijk en dient dus te worden uitgeroeid. Men maakt dan dikwijls gebruik van gif-bevattende tabletten of brokjes die onder zulke namen als 'slakkendood' worden verkocht. Als er lijsters in de buurt zijn is het gebruik daarvan sterk af te raden omdat een slak die daarvan heeft gegeten en daarom gif bevat door een lijster kan worden opgepeuzeld die daardoor ook gif binnenkrijgt, hetgeen nare gevolgen kan hebben.

Adres van de auteur:
Prins Hendrik Stichting, kamer 15
Voorstraat 41
1931 AH Egmond aan Zee